

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 12031007 Назва сорту: Леді Анна **Заявник (код):** 1787 **Власник сорту (код):** 1787

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.02.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180544

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|--------------------------|-----|
| 1 | Світловий паросток: розмір | середній | 5 |
| 2 | Світловий паросток: форма | яйцеподібна | 2 |
| 3 | Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи | сильна | 7 |
| 4 | Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи | середнє | 2 |
| 5 | Світловий паросток: опушення основи | помірне | 5 |
| 6 | Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою | середня | 5 |
| 7 | Світловий паросток: форма верхівки | закрита | 1 |
| 8 | Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки | сильне | 7 |
| 9 | Світловий паросток: опушення верхівки | помірне | 5 |
| 10 | Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків | середня кількість | 5 |
| 11 | Світловий паросток: бічні пагони за довжиною | короткі | 3 |
| 12 | Рослина: тип розвитку | проміжний | 2 |
| 13 | Рослина: габітус | напіврозлогий | 5 |
| 14 | Стебло: антоціанове забарвлення | помірне | 5 |
| 15 | Листок: загальний розмір | середній | 5 |
| 16 | Листок: за відкритістю | проміжний | 3 |
| 17 | Листок: виявлення вторинних листочків | помірне | 5 |
| 18 | Листок: зелене забарвлення | помірне | 5 |
| 19 | Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці | слабке | 3 |
| 20 | Друга пара бічних листочків: розмір | середній | 5 |
| 21 | Друга пара бічних листочків: за шириною | середні | 5 |
| 22 | Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення | рідко | 3 |
| 23 | Листочок: хвилястість краю | слабка | 3 |
| 24 | Листочок: заглиблення жилок | середнє | 5 |
| 25 | Листочок: глясуватість верхнього боку | помірно глясуватий | 5 |
| 26 | Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки | наявне | 9 |
| 27 | Бутон: антоціанове забарвлення | слабке | 3 |
| 28 | Рослина: за висотою | висока | 7 |
| 29 | Рослина: яскравість цвітіння | обрідне | 3 |
| 30 | Суцвіття: розмір | середній | 5 |
| 31 | Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки | слабке | 3 |
| 32 | Віночок квітки: розмір | середній | 5 |
| 33 | Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку | відсутнє або дуже слабка | 1 |
| 34 | Віночок квітки: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні внутрішнього боку | відсутнє або мале | 1 |
| 35 | Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці | відсутнє або дуже мале | 1 |
| 36 | Рослина: час досягання | середній | 5 |
| 37 | Бульба: форма | видовженооувальна | 4 |
| 38 | Бульба: вічка за глибиною | мілкі | 3 |
| 39 | Бульба: забарвлення шкірки | жовте | 2 |
| 40 | Бульба: забарвлення основи вічка | жовте | 2 |
| 41 | Бульба: забарвлення м'якоті | помірно жовте | 4 |
| 42 | Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла | помірне | 5 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|--|----------|---------|---------|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | | 194,5 | 160,2 |
| Вміст крохмалю, % | | 19,0 | 17,6 |
| Збір крохмалю, ц/га | | 37,0 | 28,2 |
| Вміст сухої речовини, % | | 27,4 | 25,5 |
| Тривалість періоду вегетації, днів | | 101 | 96 |
| Середня маса товарної бульби, г | | 85,6 | 79,8 |
| Дегустаційна оцінка, бал | | 7,8 | 7,9 |
| Товарність бульб, % | | 78,5 | 79,1 |
| Напрямок використання | | стл | стл |
| Лежкість, бал | | 7,3 | 7 |
| Стійкість до пошкодження нематою, бал | | 1 | 1 |
| Стійкість до звичайного патотипу збудника раку | | Стійкий | Стійкий |
| Стійкість проти макроспоріозу, бал | | 9 | 9 |
| Стійкість проти фітофторозу, бал | | 9 | 7,9 |
| Якість | | пкр | пкр |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.