

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 16088006 Назва сорту: Лусінда Заявник (код): 738 Власник сорту (код): 738

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.03.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180552

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: розмір	середній	5
2	Світловий паросток: форма	сферична	1
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	багато	7
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	середні	5
12	Рослина: тип розвитку	стебловий	1
13	Рослина: габітус	прямий	3
14	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабе	1
15	Листок: загальний розмір	малий	3
16	Листок: за відкритістю	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	слабе	3
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	відсутнє або дуже слабе	1
20	Друга пара бічних листочків: розмір	малий	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	відсутні або дуже рідко	1
23	Листочок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
24	Листочок: заглиблення жилок	мілке	3
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабе	3
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5
30	Суцвіття: розмір	середній	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабе	3
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	слабка	3
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1
36	Рослина: час досягання	середній	5
37	Бульба: форма	короткоовальна	2
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	відсутнє або дуже слабе	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га		237,4	181,4
Вміст крохмалю, %		15,2	15,7
Збір крохмалю, ц/га		36,1	28,5
Вміст сухої речовини, %		22,3	22,9
Тривалість періоду вегетації, днів		104	109
Середня маса товарної бульби, г		123,4	86,7
Дегустаційна оцінка, бал		7	7
Товарність бульб, %		73,0	88,0
Напрямок використання		стл	стл
Лежкість, бал		7,5	-
Стійкість до пошкодження нематодою, бал		9	9
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку		Стійкий	Стійкий
Стійкість проти макроспоріозу, бал		9	9
Стійкість проти фітофторозу, бал		9	9
Якість		скр	скр

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.