

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 09040063 Назва сорту: Золота осінь Заявник (код): 1109 Власник сорту (код): 1109

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету: 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.06.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171149

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|------|--|----------------------------------|-----|
| 1 | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила | наявне | 9 |
| 2 | Рослина: тип розвитку | детермінантний | 1 |
| 3 | Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють) | середня | 5 |
| 4 | Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині | відсутнє або дуже слабе | 1 |
| 5 | Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям | ознака не визначається | 0 |
| 6 | Листок: положення (у середній третині рослини) | горизонтальне | 5 |
| 7 | Листок: за довжиною | короткий | 3 |
| 8 | Листок: за шириною | середній | 5 |
| 9 | Листок: за розсіченістю | двічі перистий | 2 |
| 10 | Листок: розмір листочків (у середній частині листка) | середній | 5 |
| 11 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 |
| 12 | Листок: глянсуватість (як для б) | слабка | 3 |
| 13 | Листок: пухирчастість (як для б) | помірна | 5 |
| 14 | Листок: розмір пухирів (як для б) | середній | 5 |
| 15 | Листок: положення черешка листочків відносно головної осі | піднесене | 3 |
| 16 | Суцвіття: за типом | порівну не галузисте і галузисте | 2 |
| 17 | Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття) | наявна | 9 |
| 18 | Квітка: опушення приймочки маточки | відсутнє або дуже слабе | 1 |
| 19 | Квітка: забарвлення | жовте | 1 |
| 20 | Квітковіжка: відокремлюючий шар | відсутній | 1 |
| 21 | Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітковіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки) | ознака не визначається | 0 |
| 22 | Плід: розмір | середній | 5 |
| 23 | Плід: відношення довжини до діаметра | мале | 3 |
| 24 | Плід: форма повздовжнього розрізу | округла | 3 |
| 25 | Плід: ребристість біля плодоніжки | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 26 | Плід: форма поперечного перерізу | кругляста | 2 |
| 27 | Плід: заглиблення біля плодоніжки | відсутнє або дуже мілке | 1 |
| 28 | Плід: розмір рубця плодоніжки | середній | 5 |
| 29 | Плід: розмір квіткового рубця | дуже малий | 1 |
| 30 | Плід: форма кінця плоду | плеската | 3 |
| 31 | Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі | середній | 5 |
| 32 | Плід: перикарпій за товщиною | середній | 5 |
| 33 | Плід: кількість насінневих камер | чотири, п'ять або шість | 4 |
| 34 | Плід: зелене плече (перед досяганням) | відсутнє | 1 |
| 35 | Плід: розмір зеленого плеча (як для 34) | ознака не визначається | 0 |
| 36 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням) | ознака не визначається | 0 |
| 37 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча)(перед досяганням) | слабка | 3 |
| 38 | Плід: забарвлення (за досягання) | рожеве | 4 |
| 39 | Плід: забарвлення м'якоті (за досягання) | рожеве | 4 |
| 40 | Плід: за твердістю | м'який | 3 |
| 41 | Плід: термін лежкості | короткий | 3 |
| 42 | Час цвітіння | середній | 5 |
| 43 | Час досягання | середній | 5 |
| 44 | Плід: вміст сухої речовини (за досягання) | низький | 3 |
| 45 | Наявність сріблястості | сприятливий | 9 |
| 46 | Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i> | ознака не визначалась | 0 |
| 47 | Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i> | ознака не визначалась | 0 |
| 48,1 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> | ознака не визначалась | 0 |
| 48,2 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Паса 1 | ознака не визначалась | 0 |
| 49 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i> | ознака не визначалась | 0 |
| 50,1 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>) | ознака не визначалась | 0 |
| 50,2 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А | ознака не визначалась | 0 |
| 50,3 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В | ознака не визначалась | 0 |
| 50,4 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С | ознака не визначалась | 0 |
| 50,5 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D | ознака не визначалась | 0 |
| 50,6 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E | ознака не визначалась | 0 |
| 51,1 | Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i> | ознака не визначалась | 0 |
| 51,2 | Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1 | ознака не визначалась | 0 |
| 51,3 | Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2 | ознака не визначалась | 0 |
| 51,4 | Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2 | ознака не визначалась | 0 |
| 52 | Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i> | ознака не визначалась | 0 |
| 53 | Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i> | ознака не визначалась | 0 |
| 54 | Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp. | ознака не визначалась | 0 |
| 55 | Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> | ознака не визначалась | 0 |

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|-----------------------|-----|
| 56 | Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i> | ознака не визначалась | 0 |
| 57 | Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus | ознака не визначалась | 0 |
| 58 | Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus | ознака не визначалась | 0 |
| 59 | Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i> | ознака не визначалась | 0 |
| 60 | Стійкість проти <i>Didium lycopersicum</i> | ознака не визначалась | 0 |

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 68,2 т/га. Маса товарного плоду – 75 г. Період від повних сходів до початку дозрівання – 113 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.