

Вид: Селера коренеплідна *Apium graveolens* L. var. *rapaceum* (Mill.) Gaud.

Заявка № 15201001 Назва сорту: Світоч **Заявник (код):** 1708 **Власник сорту (код):** 1708

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.06.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171161

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за висотою	середня	5
2	Листок: положення у просторі	напівпряме	3
3	Листки: кількість	середня	5
4	Листя: діаметр коренеплоду в місці прикріплення черешків	великий	7
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішніх листків	помірна	5
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
7	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5
8	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
9	Листкова пластинка: відстань між 1-ю та 2-ю парами листочків	довга	7
10	Черешок: за довжиною	середній	5
11	Черешок: за ширину	середній	5
12	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9
13	Листкова пластинка: розмір верхівкового листочка	середній	5
14	Листочек: форма краю верхівки	гостра	1
15	Листочек: щільність надрізів краю	нешільна	3
16	Листочек: розміщення часток	дотичне	2
17	Коренеплід: розмір	малий	3
18	Коренеплід: виступ на поверхні	помірний	5
19	Коренеплід: основне забарвлення шкірки	коричневе	2
20	Лише для сортів, коренеплоди яких коричневого забарвлення. Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення шкірки	слабка	3
21	Коренеплід: місце розміщення коренів	середнє	5
22	Коренеплід: кількість коренів	велика	7
23	Коренеплід: корені за товщиною	середні	5
24	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	обернено-широкоеліптична	3
25	Коренеплід: забарвлення мякоті	біле	1
26	Коренеплід: внутрішнє заглиблення	мале	3
27	Коренеплід: губчастоподібність мякоті	слабка	3
28	Коренеплід: внутрішня іржаста плямистість мякоті	слабка	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Збір сухої речовини в середньому за рік використання – 2,2 т/га. Тривалість періоду від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стигlosti – 185 діб. Середня маса коренеплоду – 290 г. Посухостійкість – 7 балів. Вміст клітковини – 1,2 %. Лежкість – 7 балів. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): борошниста роса – 7, септоріоз – 9, суха гниль – 9, біла гниль – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.