

Вид: Селера черешкова *Apium graveolens* L. var. *dulce* (Mill.) Pers.

Заявка № 14554001 Назва сорту: Малахіт **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.08.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171162

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за висотою	середня	5
2	Рослина: кількість бічних пагонів	середня	5
3	Листки: положення в просторі	пряме	1
4	Листки: кількість	середня	5
5	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення (за виключенням черешка)	сильна	7
6	Листки: глянуватість	помірна	5
7	Листки: пухирчастість	слабка	3
8	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5
9	Листок: відстань між 1-ю та 2-ю парами листочків	середня	5
10	Листок: розмір верхівкового листочка	великий	7
11	Листочок: форма краю верхівки	округла	2
12	Листочок: щільність надрізів краю	нещільна	3
13	Листочок: розміщення часток	дотичне	2
14	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
15	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
16	Черешок: за довжиною	середній	5
17	Черешок: за шириною	широкий	7
18	Черешок: ребристість	помірна	5
19	Черешок: профіль поперечного перерізу внутрішньої частини	дуже увігнутий	3
20	Черешок: суцільне знебарвлення	відсутнє	1
21	Лише для сортів, у яких відсутнє суцільне знебарвлення. Черешок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зеленої маси, т/га в т. ч.: урожайність черешків без листової пластинки – 20–30 т/га. Тривалість періоду від сходів до збирання товарної продукції – 75 діб. Посухостійкість – 9 балів. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe umbeliferarum* D.B.) – 9, церкоспороз (*Cercospora apii* Fres.) – 9. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): моркв'яна муха (*Psila rosae* F.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся, закритий ґрунт.