

Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.

Заявка № 14155001 Назва сорту: ДІПЛО **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.04.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180554

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіннина: забарвлення шкірки	різнокольорове	3
2	Плоїдність	диплоїд	2
3	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
4	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
5	Рослина: за висотою у рік сівби	низька	3
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівби	сильна	7
7	Рослина: габітус восени у рік сівби	напівпрямий	3
8	Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівби	сильна	7
9	Рослина: за висотою навесні	низька	3
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною	помірна	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Стебло: за довжиною	середнє	5
13	Стебло: за товщиною	тонке	3
14	Стебло: кількість міжвузлів	середня	5
15	Стебло: щільність опушення	помірна	5
16	Листок: форма центрального листочка	видовжена	1
17	Листок: центральний листочок за довжиною	довгий	7
18	Листок: центральний листочок за шириною	середній	5
19	Листок: частота наявності білих міток	дуже висока	9
20	Рослина: за природною висотою другого укусу	низька	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га		61,1	68,8
Довірчий інтервал, ц/га (±)		9,0	4,7
Урожайність, сухої речовини, ц/га		81	81,7
+, - до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га		19,8	12,9
+, - до усередненого значення за 5 попередніх років, %		32	19
Тривалість періоду вегетації, днів		83	74
Стійкість до вилягання, бал		8	7
Стійкість до посухи, бал		8	7
Стійкість проти стеблової іржі, бал		9	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	8
Стійкість проти антракнозу, бал		8	8
Перезимувало рослин, бал		8	7
Залистяність, %		44,5	47,8
Вміст сирого протеїну, %		19,5	19,3
Напрямок використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.