

Вид: Сорго цукрове *Sorghum saccharatum* (L.) Moench

Заявка № 15241001 Назва сорту: Медстер **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.03.2018 **Патент №** 180745

Дата пріоритету: 01.12.2015

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180754

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|------------------------|-----|
| 1 | Паросток: антоціанове забарвлення | наявне | 9 |
| 2 | Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення | помірна | 5 |
| 3 | Рослина: швидкість початкового росту | середня | 5 |
| 4 | Рослина: кількість листків | середня | 5 |
| 5 | Рослина: час появи волоті | ранній | 3 |
| 6 | Рослина: за висотою | дуже висока | 9 |
| 7 | Листок: за довжиною | середній | 5 |
| 8 | Листок: за шириною | вузький | 3 |
| 9 | Листок: забарвлення центральної жилки листка | зелене | 2 |
| 10 | Суцвіття: форма | обернено-конусоподібна | 4 |
| 11 | Суцвіття: положення у просторі | пряме | 1 |
| 12 | Суцвіття: за щільністю | нещільне | 3 |
| 13 | Суцвіття: за довжиною без шийки | середнє | 5 |
| 14 | Суцвіття: за шириною в середній частині | широке | 7 |
| 15 | Нижня квіткова луска: остюк | наявний | 9 |
| 16 | Нижня квіткова луска: вираження остюка | сильне | 7 |
| 17 | Зернівка: інтенсивність коричневого забарвлення | сильна | 7 |
| 18 | Зернівки: маса 1000 шт. | середня | 5 |
| 19 | Волоть: зазерненість | наявна | 9 |
| 20 | Для сортів, що не утворюють зерна. Ступінь стерильності | ознака не визначається | 0 |
| 21 | Рослина: час досягання | дуже ранній | 1 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|--|----------|-------|---|
| | С | Л | П |
| Урожайність сухої речовини, ц/га | 98,7 | 113,0 | - |
| Вегетаційний період від повних сходів до початку воскової стиглості, діб | 93 | 94 | - |
| Стійкість до посухи, бал | 7 | 9 | - |
| Стійкість проти бактеріозу, бал | 7 | 9 | - |
| Стійкість проти темно-бурої плямистості, бал | 7 | 9 | - |
| Стійкість проти сажки, бал | 7 | 9 | - |
| Вміст сирого протеїну, % | 9,0 | 8,8 | - |
| Вміст сирі клітковини, % | 28,8 | 29,3 | - |
| Блок: на зелену масу | | | |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.