

Вид: Флокс волотистий *Phlox paniculata* L.**Заявка № 15335002 Назва сорту:** Мереживо Перлів **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №**Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.06.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 171137****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за висотою	висока	7
2	Рослина: габітус	компактний	1
3	Стебло: наявність антоціанового забарвлення	відсутнє	1
4	Стебло: опущеність	відсутня	1
5	Стебло: забарвлення під час повного цвітіння	світло-зелене	2
6	Листок: форма	ланцетна	1
7	Листок: антоціанове забарвлення верхнього боку	відсутнє	1
8	Листок: основне забарвлення під час цвітіння	темно-зелене	3
9	Листок: строкатість	відсутня	1
10	Листок: додаткове забарвлення у строкатолисткових сортів	ознака не визначається	0
11	Листок: характер виявлення додаткового забарвлення	ознака не визначається	0
12	Листок: опущеність нижнього боку	відсутня	1
13	Листок: положення стосовно стебла (в середній третині)	спрямований доверху	1
14	Листок: вигляд у профіль	викуплений	3
15	Листок: характер розміщення жилок	заглиблений	2
16	Суцвіття: за формою	округле	2
17	Суцвіття: діаметр	середній	5
18	Суцвіття: за щільністю	помірне	5
19	Квітка: забарвлення пуп'янка	біле	1
20	Квітка: тип розвитку віночка	нормальній	3
21	Квітка: діаметр	середній	5
22	Пелостки: розташування у сформованому віночку	слабко перекриваються	2
23	Квітка: профіль віночка	плаский	2
24	Квітка: тип забарвлення верхнього боку	двохолірний	2
25	Квітка: основне забарвлення верхнього боку віночка	біле	1
26	Квітка: переважаюче забарвлення трубки віночка	біле	1
27	Пелостка: розподіл забарвлення у одноколірних сортів	ознака не визначається	0
28	Квітка: тип додаткового забарвлення у дво-триколірних сортів	центр	3
29	Квітка: додаткове забарвлення у дво-триколірних сортів	синьо-рожеве	19
30	Квітка: стійкість забарвлення до вигорання	не вигоряє	3
31	Пелостка: форма краю	округла	1
32	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
33	Квітка: характер оцвітини за відцвітання	частково відпадає	2
34	Рослина: плодоношення	наявне	9

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Період від початку цвітіння до втрати декоративності – 33 доби. Стійкість квіток за зрізування – 8 діб. Зимостійкість – 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.