

Вид: Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L.**Заявка № 16095004 Назва сорту:** НОРВЕРТ **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 15.05.2018 **Патент №** 180845**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 25.04.2018**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180516****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	ознака не визначається	0
3	Стебло: фасціація	відсутня	1
4	Стебло: за довжиною	середнє	5
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включено)	середня	5
6	Листя: забарвлення	зелене	2
7	Лиш сорти з зеленим забарвленням листків: (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5
8	Листок: листочки	наявні	9
9	Листок: максимальна кількість листочків	середня	5
10	Листочек: розмір	середній	5
11	Листочек: за довжиною	середній	5
12	Листочек: за ширину	середній	5
13	Листочек: положення найширшої частини	посередині або більше до основи	1
14	Листочек: зубчастість	відсутня або дуже слабка	1
15	Прилисток: за довжиною	середній	5
16	Прилисток: за ширину	середній	5
17	Прилисток: розмір	середній	5
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	середня	5
20	Прилисток: плямистість	наявна	9
21	Прилисток: щільність плямистості	нешильна	3
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	короткий	3
23	Лиш сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	ознака не визначається	0
24	Рослина: час цвітіння	ранній	3
25	Лиш сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дзві	3
26	Лиш сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0
27	Лиш сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	кремове	3
28	Квітка: парус за ширину	вузький	3
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7
30	Квітка: хвилястість паруса	слабка	3
31	Квітка: чашолисток за ширину	середній	5
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	коротка	3
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3
36	Квітконос: кількість приквітків	середня	2
37	Біб: за довжиною	середній	5
38	Біб: за ширину	вузький	3
39	Біб: пергаментний шар	сучтний	2
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0
41	Лиш сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	ознака не визначається	0
42	Біб: вигин	середній	5
43	Біб: забарвлення	зелене	2
44	Лиш сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	велика	7
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
48	Насіння: форма	циліндрична	2
49	Насіння: тип крохмальних зерен	складний	2
50	Лиш сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насіння: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0
51	Лиш сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насіння: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	помірна	5
52	Насіння: забарвлення сім'ядолей	зелене	1
53	Лиш сорти з антоціановим забарвленням. Насіння: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0
54	Лиш сорти з антоціановим забарвленням. Насіння: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0
55	Насіння: забарвлення рубчика	Не відрізняється від насіннєвої шкірки	1
56	Лиш сорти з антоціановим забарвленням. Насіння: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0
57	Насіння: маса	дуже мала	1
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	наявна	9
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	відсутня	1
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	ознака не визначалась	0
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	ознака не визначалась	0
62	Тип розвитку	ярий	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність бобів, т/га – 8. Урожайність ранньої продукції, т/га – 7. Маса 1000 зерен, г – 100. Період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 70. Тривалість плодоношення, діб – 4. Ураженість хворобами, %: аскохітоз, коренева гниль – 7. Вміст сухої речовини в зерні, % – 15, загального цукру, % – 6, білка, % – 20. Якість бобів: боби з пергаментом, % – 100.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.