

Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraultmontia* Filov

Заявка № 17148002 Назва сорту: Невіра Заявник (код): 2277 Власник сорту (код): 2277

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.05.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180525

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: форма сім'ядолей	еліптична	2
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	слабка	3
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолей	випукла	3
4	Рослина: габітус	кущовий	1
5	Рослина: галузнення	відсутнє	1
6	Рослина: ступінь галузнення	ознака не визначається	0
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	напівпряме	3
8	Стебло: забарвлення	частково зелене і частково жовте	2
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1
12	Листкова пластинка: розмір	великий	7
13	Листкова пластинка: розсіченість	помірна	5
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	ознака не визначалась	0
17	Черешок: за довжиною	середній	5
18	Черешок: кількість шипів	середня	5
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	відсутнє	1
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	ознака не визначалась	0
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	мале	3
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	конічно-еліптична	3
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	кремове	2
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0
30	Плід: переважаюча форма	циліндрична	9
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	середній	5
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	середній	5
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	середнє	5
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	загострений	2
46	Плід: боріздки	відсутні	1
47	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0
48	Плід: ребра	відсутні	1
49	Плід: ступінь виявлення ребер	ознака не визначається	0
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	зелене	4
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	одна третина від апікального кінця	2
54	Плід: смужки на боріздках	наявні	9
55	Плід: забарвлення смужок на боріздках	темно-зелені	1
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	ознака не визначалась	0
57	Плід: плямистість	відсутня	1

№	Ознака	Проявлення	Код
58	Плід: розмір основних плям	ознака не визначається	0
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	ознака не визначалась	0
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0
64	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3
65	Плід: плодоніжка за довжиною	довга	7
66	Плід: забарвлення плодоніжки	частково жовте і частково зелене	3
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	слабка	3
68	Плід: крапчастість плодоніжки	відсутня	1
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	кремове	3
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	ознака не визначається	0
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	білувате	1
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	наявний	9
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	слабкий	3
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	відсутнє	1
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1
77	Насінина: розмір	середній	5
78	Насінина: форма	вузькоеліптична	3
79	Насінина: лушпиння	наявне	9
80	Насінина: наявне лушпиння	рудиментарне	1
81	Насінина: забарвлення	кремове	2

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 60. Період від масових сходів до настання технічної стиглості, діб – 70. Товарність, % – 86. Вміст сухої речовини, % – 3,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 7, бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson), фузаріозне в'янення (*Fusarium niveum* E.Sm.), вірусні хвороби – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.