

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка №** 14009234 **Назва сорту:** Мованна **Заявник (код):** 2030 **Власник сорту (код):** 2030

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.03.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 170489

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №    | Ознака   | Проявлення                    | Код |
|------|--|-------------------------------|-----|
| 1    | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви   | сильне                        | 7   |
| 2    | Перший листок: форма верхівки  | округла                       | 3   |
| 3    | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення   | помірна                       | 2   |
| 4    | Листок: хвилястість краю пластинки   | помірна                       | 2   |
| 5    | Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом  | малий                         | 3   |
| 6    | Листок: положення пластинки у просторі   | пряме                         | 1   |
| 7    | Стебло: зигзагоподібність  | відсутня або дуже слабка      | 1   |
| 8    | Волоть: час цвітіння   | від дуже раннього до раннього | 2   |
| 9    | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски  | слабке                        | 3   |
| 10   | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи  | слабке                        | 3   |
| 11   | Волоть: антоціанове забарвлення пиляків  | сильне                        | 7   |
| 12   | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками  | середній                      | 5   |
| 13   | Волоть: положення бічних гілочок у просторі  | ледь похиле                   | 3   |
| 14   | Волоть: кількість первинних бічних гілочок   | мала                          | 3   |
| 15   | Качан: час появи шовку   | ранній                        | 3   |
| 16   | Качан: антоціанове забарвлення шовку   | слабке                        | 3   |
| 17   | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів   | сильне                        | 7   |
| 18   | Волоть: щільність розташування колосків  | середньої щільності           | 5   |
| 19   | Листок: антоціанове забарвлення піхви  | відсутнє або дуже слабке      | 1   |
| 20   | Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів  | відсутнє або дуже слабке      | 1   |
| 21   | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)  | середня                       | 5   |
| 22   | Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)   | коротка                       | 3   |
| 23   | Волоть: бічна гілочка за довжиною  | коротка                       | 3   |
| 24,1 | Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною                                     | ознака не визначається        | 0   |
| 24,2 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною | дуже довга                    | 9   |
| 25   | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини   | мале                          | 3   |
| 26   | Листок: ширина пластинки   | середня                       | 5   |
| 27   | Качан: ніжка за довжиною   | середня                       | 5   |
| 28   | Качан: за довжиною   | середній                      | 5   |
| 29   | Качан: діаметр (посередині)  | великий                       | 7   |
| 30   | Качан: форма   | конусно-циліндрична           | 2   |
| 31   | Качан: кількість зернових рядів  | середня                       | 5   |
| 32   | Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин   | ознака не визначається        | 0   |
| 33   | Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору   | ознака не визначається        | 0   |
| 34   | Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною   | ознака не визначається        | 0   |
| 35   | Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною  | ознака не визначається        | 0   |
| 36   | Качан: тип зернівки  | зубовидноподібний             | 4   |
| 37   | Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок  | ознака не визначається        | 0   |
| 38   | Качан: забарвлення верхівки зернівки   | жовте                         | 3   |
| 39   | За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки  | жовто-оранжеве                | 4   |
| 40   | Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення  | ознака не визначається        | 0   |
| 41   | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня   | відсутнє або дуже слабке      | 1   |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник  | Значення |       |       |
|---|----------|-------|-------|
|   | С        | Л     | П     |
| Урожайність, ц/га   | 55,4     | 76,6  | 72,8  |
| ± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га | 8,3      | 0,9   | 0,5   |
| ± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %    | 18       | 1     | 1     |
| Збиральна вологість зерна, %                                    | 15,5     | 18,1  | 21,3  |
| Тривалість періоду вегетації, діб                               | 106,3    | 117,0 | 115,6 |
| Вихід зерна при обмолоті, %                                     | 81,2     | 77,8  | 79,8  |
| Стійкість до, бал   |          |       |       |
| посухи  | 8,4      | 8,6   | 8,8   |
| вилягання   | 9        | 9     | 9     |
| пухирчастої сажки   | 9        | 9     | 9     |
| Вміст, %  |          |       |       |
| білка   | 9,8      | 9,1   | 9,0   |
| крохмалю  | 71,8     | 71,7  | 71,0  |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп, Полісся.