

**Вид:** Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.

**Заявка № 16136003 Назва сорту:** Стіл **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 18.04.2018

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180538**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість стебел	одне	1
2	Рослина: за висотою (за збиральної стиглості)	середня	5
3	Листок: положення (на початку формування головки)	напівпряме	3
4	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5
5	Листок: за шириною	середній	5
6	Листок: кількість часток	велика	7
7	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	2
8	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	сильна	7
9	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	сильна	7
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3
12	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5
13	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
14	Черешок: за довжиною	довгий	7
15	Головка: галузки від основи за довжиною (за виключенням стебла)	середні	5
16	Головка: розмір	середній	5
17	Головка: форма позаднього розрізу	округла	1
18	Головка: забарвлення	сіро-зелене	3
19	Головка: інтенсивність забарвлення	сильна	7
20	Головка: антоціанове забарвлення	наявне	9
21	Головка: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: структура тканини	помірна	5
24	Головка: за щільністю	щільна	7
25	Головка: покривний листок	наявний	9
26	Рослина: вторинні головки (за збирання)	наявні	9
27	Рослина: опуклість вторинних головок (як для озн. 26)	слабка	3
28	Квітка: забарвлення	жовте	2
29	Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення	помірна	5
30	Час збиральної стиглості (50 % рослин)	дуже пізній	9
31	Час початку цвітіння (50 % рослин мають щонайменше 10 % квіток)	пізній	7
32	Чоловіча стерильність	відсутня	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 25. Тривалість періоду до досягання, діб – 185. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз судинний – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.