

Вид: Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.

Заявка № 16136005 Назва сорту: МОНРЕЛЛО **Заявник (код):** 1219 **Власник сорту (код):** 1219

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.04.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180539

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість стебел	одне	1
2	Рослина: за висотою (за збиральної стиглості)	середня	5
3	Листок: положення (на початку формування головки)	напівпряме	3
4	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	довгий	7
5	Листок: за шириною	широкий	7
6	Листок: кількість часток	середня	5
7	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	2
8	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5
9	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5
12	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5
13	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
14	Черешок: за довжиною	середній	5
15	Головка: галузки від основи за довжиною (за виключенням стебла)	середні	5
16	Головка: розмір	середній	5
17	Головка: форма позадвожнього розрізу	поперечношироко-еліптична	2
18	Головка: забарвлення	сіро-зелене	3
19	Головка: інтенсивність забарвлення	помірна	5
20	Головка: антоціанове забарвлення	наявне	9
21	Головка: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: структура тканини	м'яка	3
24	Головка: за щільністю	помірна	5
25	Головка: покривний листок	відсутній	1
26	Рослина: вторинні головки (за збирання)	відсутні	1
27	Рослина: опуклість вторинних головок (як для озн. 26)	ознака не визначається	0
28	Квітка: забарвлення	жовте	2
29	Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення	помірна	5
30	Час збиральної стиглості (50 % рослин)	пізній	7
31	Час початку цвітіння (50 % рослин мають щонайменше 10 % квіток)	пізній	7
32	Чоловіча стерильність	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 10. Тривалість періоду до досягання, діб – 86. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз судинний – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.