

Вид: Капуста савойська *Brassica oleracea* L. var. *sabauda* DC.

Заявка № 15100003 Назва сорту: ВІРАТОБА **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.04.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180542

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	середня	5
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	ознака не визначається	0
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	середній	5
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	середнє	5
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	середній	5
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояцеподібна	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	плаский	2
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	сильний	7
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	малий	3
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	середня	5
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	блакитно-зелене	4
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	сильна	7
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірний	5
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	рівна	2
19	Головка: за довжиною	коротка	3
20	Головка: діаметр	середній	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	частково покритий	2
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	сильна	7
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5
27	Лише для сортів капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	слабке	3
28	Головка: внутрішнє забарвлення	жовтувате	2
29	Лише для сортів капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	нешільна	3
31	Головка: внутрішня структура	груба	7
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лише для сортів капусти білоголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише для сортів капусти савойської. Час збиральної стиглості	пізній	7
34	Час розтріскування головки після досягання	ознака не визначалась	0
35	Чоловіча стерильність	наявна	9
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 50. Товарна врожайність, т/га – 50. Період від повних сходів до початку досягання, дів – 120. Тривалість періоду плодоношення, дів – 120. Вміст вітаміну С, мг% – 20, загального цукру, % – 3, сухої речовини, % – 11. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 2, бактеріоз судинний – 4.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.