

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 15909010 Назва сорту:** ПХ18П6 **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 19.05.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170863**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №    | Ознака  | Проявлення                 | Код |
|------|---|----------------------------|-----|
| 1    | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви  | дуже сильне                | 9   |
| 2    | Перший листок: форма верхівки   | округла                    | 3   |
| 3    | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення  | помірна                    | 2   |
| 4    | Листок: хвилястість краю пластинки  | помірна                    | 2   |
| 5    | Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом   | середній                   | 5   |
| 6    | Листок: положення пластинки у просторі  | ледь похиле                | 3   |
| 7    | Стебло: зигзагоподібність   | слабка                     | 2   |
| 8    | Волоть: час цвітіння  | від середнього до пізнього | 6   |
| 9    | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски   | відсутнє або дуже слабке   | 1   |
| 10   | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи   | слабке                     | 3   |
| 11   | Волоть: антоціанове забарвлення пиляків   | сильне                     | 7   |
| 12   | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками   | дуже великий               | 9   |
| 13   | Волоть: положення бічних гілочок у просторі   | помірно похиле             | 5   |
| 14   | Волоть: кількість первинних бічних гілочок  | відсутні або дуже мала     | 1   |
| 15   | Качан: час появи шовку  | від середнього до пізнього | 6   |
| 16   | Качан: антоціанове забарвлення шовку  | сильне                     | 7   |
| 17   | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів  | сильне                     | 7   |
| 18   | Волоть: щільність розташування колосків   | середньої щільності        | 5   |
| 19   | Листок: антоціанове забарвлення піхви   | відсутнє або дуже слабке   | 1   |
| 20   | Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів   | слабке                     | 3   |
| 21   | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)   | середня                    | 5   |
| 22   | Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)  | середня                    | 5   |
| 23   | Волоть: бічна гілочка за довжиною   | коротка                    | 3   |
| 24,1 | Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною                                     | довга                      | 7   |
| 24,2 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною | ознака не визначається     | 0   |
| 25   | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини  | дуже мале                  | 1   |
| 26   | Листок: ширина пластинки  | середня                    | 5   |
| 27   | Качан: ніжка за довжиною  | коротка                    | 3   |
| 28   | Качан: за довжиною  | дуже довгий                | 9   |
| 29   | Качан: діаметр (посередині)   | великий                    | 7   |
| 30   | Качан: форма  | конусно-циліндрична        | 2   |
| 31   | Качан: кількість зернових рядів   | середня                    | 5   |
| 32   | Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин  | ознака не визначається     | 0   |
| 33   | Лише для сортів з цукровим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору   | ознака не визначається     | 0   |
| 34   | Лише для сортів з цукровим типом зерна. Зернівка: за довжиною   | ознака не визначається     | 0   |
| 35   | Лише для сортів з цукровим типом зерна. Зернівка: за шириною  | ознака не визначається     | 0   |
| 36   | Качан: тип зернівки   | проміжний                  | 3   |
| 37   | Тільки сорти з цукровим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок  | ознака не визначається     | 0   |
| 38   | Качан: забарвлення верхівки зернівки  | жовто-оранжеве             | 4   |
| 39   | За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки  | оранжеве                   | 5   |
| 40   | Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення   | ознака не визначається     | 0   |
| 41   | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня  | помірне                    | 5   |