

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 15110012 Назва сорту: Анубіс **Заявник (код):** 1918 **Власник сорту (код):** 1918

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.05.2018 **Патент № 180884**

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гірkota	наявна	9
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	коротка	3
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	мале	3
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	світла	3
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3
12	Час розвитку жіночих квіток (80 % рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5
13	Рослина: виявлення статі	субгіномоноєційність	2
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	відсутня	1
17	Плід: за довжиною	середній	5
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	мале	3
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2
22	Плід: форма основи	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	тупа	2
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5
27	Плід: ребристість	помірна	2
28	Плід: борозенки	наявні	9
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9
30	Плід: ступінь зморшкуватості	помірний	5
31	Плід: тип покриву	волоски і шипики	2
32	Плід: покрив за щільністю	нешільний	3
33	Лише сорти з білою зав'яззю (ozn. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	середній	5
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3
37	Плід: плями	наявні	9
38	Плід: характер поширення плям	переважно смугами	2
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	виключаючи місце навколо плодоніжки	4
40	Плід: щільність плям	нешільна	3
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	коричневе	5
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i>	ознака не визначалась	0
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i>)	ознака не визначалась	0
46	Стійкість проти борошністої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	ознака не визначалась	0
47	Стійкість проти несправжньої борошністої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	ознака не визначалась	0
48	Стійкість проти бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (<i>CVYV</i>)	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)</i>)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність – 39,4 т/га, вміст сухої речовини – 3,8 %, період від повних сходів до початку споживчої стиглості – 44 доби.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.