

**Вид:** Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

**Заявка № 16110012 Назва сорту:** Рамзес **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 18.04.2018

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180640**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	наявна	9
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5
4	Листкова пластинка: положення	пряме	1
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	велике	7
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	тупа	3
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3
12	Час розвитку жіночих квіток (80 % рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3
13	Рослина: виявлення статі	субгіномоноеційність	2
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	середній	5
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1
22	Плід: форма основи	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	округла	3
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: борозенки	відсутні	1
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: покрив за щільністю	нешільний	3
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
34	Плід: горбочки	відсутні	1
35	Плід: розмір горбочків	ознака не визначалась	0
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1
37	Плід: плями	відсутні	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	зелене	3
44	Стойкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стойкість проти звичайної мозаїки огірка ( <i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	помірно стійкий	2
46	Стойкість проти борошністої роси ( <i>Podosphaera xanthii</i> )	помірно стійкий	2
47	Стойкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	ознака не визначалась	0
48	Стойкість проти бурої плямистості ( <i>Corynespora melonis</i> )	наявна	9
49	Стойкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9
50	Стойкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка ( <i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i> (CGMMV))	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 60. Вміст сухої речовини в плоді, % – 4,1. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 45. Період плодоношення, діб – 50.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.