

Вид: Рис посівний *Oryza sativa* L.

Заявка № 13017001 Назва сорту: Маршал **Заявник (код):** 1715 **Власник сорту (код):** 1715

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.03.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170613

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Основний листок: колір піхви	зелений	1
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
4	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
5	Листок: поширення антоціанового забарвлення	тільки на верхівці	1
6	Листкова піхва: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
7	Листкова піхва: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
8	Листок: опушеність поверхні пластинки	відсутня або дуже слабка	1
9	Листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутні	1
10	Листок: антоціанове забарвлення шийки	відсутнє	1
11	Листок: форма язичка	подвійний	3
12	Листок: колір язичка	безбарвний	1
13	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
14	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
15	Прапорцевий листок: положення пластинки (раннє обстеження)	напівпряме	3
16	Прапорцевий листок: положення пластинки (пізнє обстеження)	горизонтальне	5
17	Стебло: габітус	прямий	1
18	Тільки для плавального рису. Стебло: здатність утворювати коліно	ознака не визначається	0
19	Час виявлення волоті (50% рослин з волотями)	пізній	7
20	Чоловіча стерильність	відсутня	1
21	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення кіля (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1
22	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1
23	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1
24	Колосок: забарвлення приймочки	біле	1
25	Стебло: за товщиною	середнє	5
26	Стебло: за довжиною (включно волоті; плавальний рис у тому числі)	середнє	5
27	Стебло: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1
28	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	ознака не визначається	0
29	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє	1
30	Волоть: довжина головної осі	середня	5
31	Волоть: кількість на рослині	багато	7
32	Волоть: остюки	відсутні	1
33	Волоть: колір остюків (раннє обстеження)	ознака не визначається	0
34	Волоть: розташування остюків	ознака не визначається	0
35	Волоть: довжина найдовших остюків	ознака не визначається	0
36	Колосок: опушення нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
37	Колосок: колір верхівки нижньої квіткової луски	білий	1
38	Волоть: колір остюків (пізнє обстеження)	ознака не визначається	0
39	Волоть: вигин головної осі	нахилена	3
40	Волоть: наявність вторинного гілкування	відсутнє	1
41	Волоть: тип вторинного гілкування	ознака не визначається	0
42	Волоть: положення гілок	розкидисте	5
43	Волоть: характер виявлення	помірне виявлення	5
44	Час досягання	пізній	7
45	Листок: пожовтіння (старіння)	середнє	5
46	Нижня квіткова луска: забарвлення	світло-золотисте	1
47	Нижня колоскова луска: орнаментация	золоті борозни	2
48	Нижня колоскова луска: антоціанове забарвлення кіля (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1
49	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1
50	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1
51	Колоскова луска: за довжиною	середня	5
52	Колоскова луска: забарвлення	золотисте	2
53	Зернівка: маса 1000 розвинених зерен	середня	5
54	Зернівка: за довжиною	довга	7
55	Зернівка: за шириною	вузька	3
56	Нижня квіткова луска: реакція на фенол	ознака не визначалася	0
57	Нижня квіткова луска: інтенсивність фенольної реакції (забарвлення)	ознака не визначалася	0
58	Обрушена зернівка: за довжиною	довга	7
59	Обрушена зернівка: за шириною	вузька	3
60	Обрушена зернівка: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	4
61	Обрушена зернівка: за кольором	біла	1
62	Ендосперм: тип	ознака не визначалася	0
63	Ендосперм: за присутністю амілази	ознака не визначалася	0
64	Лужна дигестія	ознака не визначалася	0
65	Обрушена зернівка: аромат	ознака не визначалася	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	82,5	-	-
± до усередненої урожайності, ц/га	16,2	-	-
± до усередненої урожайності, %	24	-	-
Вегетаційний період, дів	123	-	-
Висота рослин, см.	85	-	-
Масас 1000 насінин, г.	30,9	-	-
Стійкість до вилягання, б.	9,0	-	-
Стійкість до осипання, б.	9,0	-	-
Стійкість до пiрикуляріозу, б.	9,0	-	-
Стійкість до фузаріозу, б.	9,0	-	-
Стійкість до гельмінтоспоріозу, б.	9,0	-	-
Стійкість до кореневих гнилей, б.	9,0	-	-
Стійкість до аскохітозу, б.	9,0	-	-
Вимолочуваність, б.	9,0	-	-
Плівчастість, %	17,6	-	-
Скловидність, %	94,2	-	-
Вміст білка, %	8,2	-	-
Напряв використання: харчовий			

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.