

**Вид:** Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare L.***Заявка № 13019005 Назва сорту:** АРКАНДА**Заявник (код):** 1498**Власник сорту (код):** 1498**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.03.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170752****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9
3	Пропорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Пропорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3
5	Рослина: кількість рослин із похилим пропорцевим листком	середня	5
6	Пропорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3
11	Колос: положення в просторі	напівлоникле	7
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	висока	7
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	прамдална	3
15	Колос: за щільністю	нешільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	3
18	Стрижені колоси: за довжиною першого сегменту	середній	5
19	Стрижені колоса: вигин першого сегмента	малий	3
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2
23	Зернівка: плівка	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення центральної борізdkи	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	білясте	1
29	Тип розвитку	озимий	1
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкоzmоршкувата	1
34	Тільки для підвікових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: переход від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3
37	Вушка: охоплення соломини	повне	2
38	Язичок: ступінь виявлення	слабкий	3
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	59	75,9	53
+/- до усередненого значення за 5 попередніх років			
ц/га	5,8	11,2	0,3
%	11	17	1
Вегетаційний період, днів	246	260	259
Висота рослин, см	88,9	89,7	80,8
Маса 1000 зерен, г	52,0	53,9	50,4
Польова оцінка зимостійкості, бал	8,2	7,8	7,7
Стійкість до: бал			
Вилягання	7,9	8,1	8,1
Осипання	8,9	8,6	8,8
Посухи	9,0	8,8	9,0
Борошнистої роси	8,5	8,4	8,8
Гельмінтоспоріозу	7,7	8,2	7,7
Сажки	9,0	9,0	9,0
Вміст білка, %	12,2	12,6	11,0
Напрям використання	зерно	зерно	зерно

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп, Полісся.