

Вид: Квасоля звичайна (зернова) *Phaseolus vulgaris* L.

Заявка № 13025001 Назва сорту: Ната **Заявник (код):** 1861 **Власник сорту (код):** 1861

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.05.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170811

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотіля	відсутнє	1
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотіля	ознака не визначається	0
3	Рослина: тип росту	кущовий	1
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	низька	3
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
10	Листок: зморшкуватість	слабка	3
11	Верхівковий листочок: розмір	малий	3
12	Верхівковий листочок: форма	від трикутної до округлої	2
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	довга	3
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	переважно в листках	1
15	Квітка: розмір приквітков	малий	3
16	Квітка: забарвлення паруса	біле	1
17	Квітка: забарвлення крил	біле	1
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	короткий	3
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0
20	Біб: за шириною	вузький	3
21	Біб: за товщиною	тонкий	3
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	яйцеподібна	2
23	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5
24	Біб: основне забарвлення	зелене	2
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	помірна	5
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	відсутня	1
30	Біб: ступінь вигину	слабкий	3
31	Біб: форма вигину	увігнута	1
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	від загостреної до заокругленої	2
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5
34	Біб: вигин дзьобика	середній	5
35	Біб: текстура поверхні	гладенька або слабо шерехата	3
36	Біб: звуження (в сухому стані)	помірне	2
37	Насіння: маса	мала	3
38	Насінина: форма поздовжнього розрізу	ниркоподібна	4
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину	слабкий	3
40	Насінина: форма поперечного перерізу	широкоеліптична	4
41	Насінина: за шириною в поперечному перерізі	вузька	3
42	Насінина: за довжиною	коротка	3
43	Насінина: кількість кольорів	один	1
44	Насінина: основне забарвлення (найбільша зона)	біле	1
45	Насінина: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0
46	Насінина: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0
47	Насінина: вираження орнаменту	сильне	7
48	Час цвітіння (50 % рослин мають щонайменше одну квітку)	ранній	3
49,1	Стойкість проти антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	ознака не визначалась	0
49,2	Стойкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>): Pasa Kappa	ознака не визначалась	0
50	Стойкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus	ознака не визначалась	0
51	Стойкість проти кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>)	ознака не визначалась	0
52	Стойкість проти звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота прикріплення нижнього бобу – 10 см, висота рослин – 50 см, тривалість вегетації рослин – 80 днів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.