

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 14045012 **Назва сорту:** ЕС ТЕНОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.03.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170736

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: форма росту	напіврозлога	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчатість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренояйцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насінина: форма	видовжена	3
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	13,5	23,7	19,2
± до усередненої урожайності, ц/га	-1,8	2,3	-0,6
± до усередненої урожайності, %	-12	11	-3
Маса 1000 насінин, г	137,8	164,7	166,9
Висота рослин, см	65,2	76,7	69,9
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,8	9,0
Стійкість до осипання, бал	8,6	8,7	8,5
Стійкість до засухи, бал	8,0	8,8	8,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,5	11,7	10,9
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,6	9,0	9,0
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	9,0	8,9
Стійкість до бактеріозу, бал	8,8	8,6	8,6
Стійкість до септоріозу, бал	8,8	8,9	9,0
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	8,9	9,0
Вміст білка, %	39,7	39,3	39,1
Вміст олії, %	23,0	22,3	22,0
Усереднена урожайність сортів, зареєстрованих за п'ять попередніх років, ц/га	15,2	21,4	19,7
Довірчий інтервал (ц/га), ±	0,32	0,50	0,57

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.