

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 15045001 Назва сорту: Красуня **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.03.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171052

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|-----------------------------|-----|
| 1 | Гіпокотиль: антоціанове забарвлення | наявне | 9 |
| 2 | Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | середня | 5 |
| 3 | Рослина: тип росту | напівдетермінантний | 2 |
| 4 | Рослина: форма росту | від прямої до напіврозлогої | 2 |
| 5 | Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) | рудувато-коричневе | 2 |
| 6 | Рослина: за висотою | середня | 5 |
| 7 | Листок: пухирчатість | слабка | 3 |
| 8 | Листок: форма бічного листочка (складного листка) | загостренояйцевидна | 3 |
| 9 | Листок: розмір бічного листочка | середній | 5 |
| 10 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірне | 5 |
| 11 | Квітка: забарвлення | фіолетове | 2 |
| 12 | Біб: інтенсивність коричневого забарвлення | світле | 3 |
| 13 | Насіння: маса 1000 шт. | середня | 5 |
| 14 | Насінина: форма | видовжена | 3 |
| 15 | Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують) | жовте | 1 |
| 16 | Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці | ознака не визначалась | 0 |
| 17 | Насінина: забарвлення рубчика | світло-коричневе | 3 |
| 18 | Насінина: забарвлення сім'яної рубчика | інше | 2 |
| 19 | Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою) | від раннього до середнього | 4 |
| 20 | Рослина: час досягання | від раннього до середнього | 4 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---------------------------------------|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | 15,6 | 21,8 | 19,9 |
| ± до усередненої урожайності, ц/га | 0,8 | 0,5 | -0,6 |
| ± до усередненої урожайності, % | 6 | 2 | -3 |
| Маса 1000 насінин, г | 141,6 | 165,4 | 149,3 |
| Висота рослин, см | 69,3 | 68,7 | 74,4 |
| Стійкість до вилягання, бал | 8,8 | 8,8 | 8,9 |
| Стійкість до осипання, бал | 9,0 | 8,8 | 8,8 |
| Стійкість до засухи, бал | 8,3 | 8,3 | 8,5 |
| Висота прикріплення нижнього бобу, см | 12,5 | 13,3 | 15,5 |
| Стійкість до пероноспорозу, бал | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Стійкість до аскохітозу, бал | 8,8 | 8,8 | 8,9 |
| Стійкість до бактеріозу, бал | 8,4 | 8,5 | 8,9 |
| Стійкість до септоріозу, бал | 8,6 | 8,8 | 9,0 |
| Стійкість до фузаріозу, бал | 9,0 | 8,8 | 9,0 |
| Вміст білка, % | 42,0 | 41,6 | 41,3 |
| Вміст олії, % | 21,2 | 20,8 | 19,3 |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Степ.