

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 10018022 **Назва сорту:** Криниця **Заявник (код):** 404 **Власник сорту (код):** 404

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету: 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.03.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171042

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4
4	Рослина: форма росту	пряма	1
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчатість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренояцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	світле	3
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насінина: форма	куляста	1
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насінної оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50 % рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	20,6	23,3	19,0
Прибавка до національного стандарту, ц/га	1,0	0,4	1,0
Прибавка до національного стандарту, %	5,1	1,7	5,6
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	0,3	0,8	-1,4
Прибавка до умовного стандарту, %	2	3	-7
Маса 1000 насінин, г	143,9	156,4	167,6
Висота рослин, см	67,5	65,4	68,1
Вегетаційний період, днів	106	119	131
Стійкість до вилягання, бал	8,7	8,5	8,3
Стійкість до осипання, бал	8,7	8,8	9,0
Стійкість до засухи, бал	7,9	8,2	8,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,8	12,5	12,6
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до септоріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст білка, %	39,6	39,4	39,1
Вміст олії, %	19,7	20,0	19,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Степ.