

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 14045015 Назва сорту: Переяславка **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.03.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171050

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	вiсyтнє	1
2	Гіпокотиль: iнтенсивнiсть антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Рослина: тип росту	напiвдетермiнантий	2
4	Рослина: форма росту	напiврозлога	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сiре	1
6	Рослина: за висотою	вiд середньої до високої	6
7	Листок: пухирчатiсть	слабка	3
8	Листок: форма бiчного листочка (складного листка)	загостренояйцевидна	3
9	Листок: розмiр бiчного листочка	великий	7
10	Листок: iнтенсивнiсть зеленого забарвлення	помiрне	5
11	Квiтка: забарвлення	бiле	1
12	Бiб: iнтенсивнiсть коричневого забарвлення	свiтле	3
13	Насiння: маса 1000 шт.	мала	3
14	Насiнина: форма	кулясто-плеската	2
15	Насiнина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насiнина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насiнній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насiнина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насiнина: забарвлення сiм'яної рубчика	iнше	2
19	Рослина: час початку цвiтiння (50 % рослин щонайменше з однією відкритою квiткою)	вiд дуже раннього до раннього	2
20	Рослина: час досягання	вiд дуже раннього до раннього	2

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	13,9	22	18,2
± до усередненої урожайності, ц/га	-1,4	0,5	-1,5
± до усередненої урожайності, %	-9	2	-8
Маса 1000 насiнин, г	117,2	143,5	141,1
Висота рослин, см	79,1	79,9	85,3
Стійкiсть до вилягання, бал	8,8	8,4	8,8
Стійкiсть до осипання, бал	8,8	8,8	9,0
Стійкiсть до засухи, бал	7,8	8,6	8,4
Висота прикрiплення нижнього бобу, см	14,6	14,1	13,8
Стійкiсть до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкiсть до аскохiтозу, бал	8,6	8,6	9,0
Стійкiсть до бактерiозу, бал	9,0	8,5	8,4
Стійкiсть до септорiозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкiсть до фузарiозу, бал	9,0	8,7	9,0
Вмiст бiлка, %	40,3	40,1	40,0
Вмiст олії, %	22,8	22,0	21,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.