

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 13045010 **Назва сорту:** Ранок **Заявник (код):** 1702 **Власник сорту (код):** 1702

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.03.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171045

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	вісутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: форма росту	напіврозлога	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчатість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренояцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	біле	1
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	світле	3
13	Насіння: маса 1000 шт.	мала	3
14	Насінина: форма	видовжена	3
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50 % рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	ранній	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	15,1	21,2	20,4
± до усередненої урожайності, ц/га	0,3	-0,1	-0,1
± до усередненої урожайності, %	2	0	0
Маса 1000 насінин, г	121,0	139,3	140,7
Висота рослин, см	69,0	73,1	71,8
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,9	9,0
Стійкість до осипання, бал	8,4	8,6	8,5
Стійкість до засухи, бал	8,4	8,3	8,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,1	13,2	13,5
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	9,0	8,9
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	8,4	8,6
Стійкість до септоріозу, бал	8,8	9,0	9,0
Стійкість до фузаріозу, бал	8,8	8,9	9,0
Вміст білка, %	40,5	40,2	39,3
Вміст олії, %	24,1	23,5	22,2
Усереднена урожайність сортів, зареєстрованих за п'ять попередніх років, ц/га	14,8	21,3	20,5
Довірчий інтервал (ц/га), ±	0,32	0,50	0,57

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ.