

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка №** 14045029 **Назва сорту:** СКУЛЬПТОР **Заявник (код):** 926 **Власник сорту (код):** 926

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.03.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 170739

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: форма росту	від прямої до напіврозлогої	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчатість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренояцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	велика	7
14	Насінина: форма	видовжена	3
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50 % рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	15,3	21	18,9
± до усередненої урожайності, ц/га	0,1	-0,4	-0,8
± до усередненої урожайності, %	0	-2	-4
Маса 1000 насінин, г	152,8	188,3	208,6
Висота рослин, см	83,6	84,5	80,8
Стійкість до вилягання, бал	8,8	8,7	9,0
Стійкість до осипання, бал	8,8	8,5	8,0
Стійкість до засухи, бал	8,3	8,2	8,2
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,3	12,5	12,2
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	8,7	9,0
Стійкість до аскохітозу, бал	8,8	8,6	8,8
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	8,5	8,8
Стійкість до септоріозу, бал	8,8	9,0	9,0
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	8,9	9,0
Вміст білка, %	41,6	41,9	41,7
Вміст олії, %	22,8	21,9	20,1
Усереднена урожайність сортів, зареєстрованих за п'ять попередніх років, ц/га	15,2	21,4	19,7
Довірчий інтервал (ц/га), ±	0,32	0,50	0,57

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп.