

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 13041005 **Назва сорту:** Аксана **Заявник (код):** 1991 **Власник сорту (код):** 1991

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.05.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170963

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	відсутні	1
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	ознака не визначалась	0
7	Листок: зубчастість краю	слабка	3
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	ознака не визначалась	0
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	довгі	7
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізнюльотньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	10,3	22,4	15,1
± до усередненої урожайності, ц/га	0,5	3,3	-2,3
± до усередненої урожайності, %	6	18	-13
Маса 1000 насінин, г	3,9	4,3	3,7
Стійкість до вилягання, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до посухи, бал	7,5	8,1	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,0	7,5	7,5
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	8,8	7,3
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	8,8	6,5
Вміст олії, %	43,5	45,1	46,2
Вміст білка, %	26,5	24,1	23,2
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Степ.