

**Вид:** Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera*

**Заявка № 13041011 Назва сорту:** КЛІК КЛ **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.03.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170625**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мало	3
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	довгий	7
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	9,4	21,6	13,3
± до усередненої урожайності, ц/га	-0,3	2,6	-4,1
± до усередненої урожайності, %	-3	13	-23
Маса 1000 насінин, г	3,8	4,3	3,5
Стійкість до вилягання, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до посухи, бал	7,0	8,3	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,5	7,3	6,8
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	8,8	6,8
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	8,8	7,0
Вміст олії, %	44,1	45,2	46,1
Вміст білка, %	25,5	24,1	23
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,8

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Лісостеп.