

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка №** 14039128 **Назва сорту:** РЖТ КЛЛЕРІО **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.03.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 170705

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака   | Проявлення                            | Код |
|----|--|---------------------------------------|-----|
| 1  | Гіпокотиль: антоціанове забарвлення  | наявне                                | 9   |
| 2  | Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення  | сильна                                | 7   |
| 3  | Листок: розмір   | середній                              | 5   |
| 4  | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення   | помірна                               | 5   |
| 5  | Листок: пухирчастість  | помірна                               | 5   |
| 6  | Листок: зубці  | великі                                | 7   |
| 7  | Листок: форма поперечного перерізу   | плеската                              | 3   |
| 8  | Листок: форма верхівки   | широкотрикутна                        | 5   |
| 9  | Листок: вушка  | великі                                | 7   |
| 10 | Листок: крила  | слабко виражені                       | 2   |
| 11 | Листок: кут між найнижчими бічними жилками   | прямий або близький до прямого        | 2   |
| 12 | Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)                 | вище                                  | 7   |
| 13 | Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)   | дуже сильне                           | 9   |
| 14 | Час цвітіння   | середній                              | 5   |
| 15 | Язичкові квітки: щільність розміщення  | помірно щільно                        | 5   |
| 16 | Язичкові квітки: за формою   | широкоюяцеподібні                     | 3   |
| 17 | Язичкові квітки: положення відносно кошика   | зігнуте за довжиною                   | 2   |
| 18 | Язичкові квітки: за довжиною   | середні                               | 5   |
| 19 | Язичкові квітки: забарвлення   | помірно жовте                         | 3   |
| 20 | Трубчасті квітки: забарвлення  | оранжеве                              | 2   |
| 21 | Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки  | відсутнє                              | 1   |
| 22 | Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки  | ознака не визначається                | 0   |
| 23 | Трубчасті квітки: продукування пилку   | наявне                                | 9   |
| 24 | Листки обгортки: за формою   | нечітко видовжені, нечітко округлі    | 2   |
| 25 | Листки обгортки: верхівка за довжиною  | середня                               | 5   |
| 26 | Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку   | помірна                               | 5   |
| 27 | Листки обгортки: положення відносно кошика   | не охоплює або дуже злегка охоплює    | 1   |
| 28 | Рослина: за висотою  | середня                               | 5   |
| 29 | Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)                        | відсутнє                              | 1   |
| 30 | Рослина: тип галуження (як для 29)   | ознака не визначається                | 0   |
| 31 | Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика                              | ознака не визначається                | 0   |
| 32 | Кошик: положення   | напівобернене донизу з прямим стеблом | 4   |
| 33 | Кошик: розмір  | середній                              | 5   |
| 34 | Кошик: за формою з боку сім'янок   | злегка випуклий                       | 4   |
| 35 | Сім'янка: розмір   | середній                              | 5   |
| 36 | Сім'янка: форма  | широкоюяцеподібна                     | 3   |
| 37 | Сім'янка: за товщиною відносно ширини  | середня                               | 5   |
| 38 | Сім'янка: основне забарвлення  | чорне                                 | 7   |
| 39 | Сім'янка: смужки на краях  | слабко виражені                       | 2   |
| 40 | Сім'янка: смужки між краями  | відсутні або дуже слабко виражені     | 1   |
| 41 | Сім'янка: забарвлення смужок   | сіре                                  | 2   |
| 42 | Сім'янка: плямистість перикарпю  | відсутня                              | 1   |
| 43 | Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )   | наявна                                | 9   |
| 44 | Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.) | наявна                                | 9   |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник  | Значення |         |   |
|---|----------|---------|---|
|   | С        | Л       | П |
| Урожайність, ц/га   | 21,9     | 20,5    |   |
| ± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га | 2,5      | 0,4     |   |
| ± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %    | 13       | 2       |   |
| Діаметр кошика, см  | 15,3     | 16,4    |   |
| Маса 1000 сім'янок, г   | 54,6     | 62,1    |   |
| Висота рослин, см   | 164      | 171     |   |
| Стійкість до вилягання, бал                                     | 8,8      | 9,0     |   |
| Стійкість до білої гнилі, бал                                   | 9,0      | 8,9     |   |
| Стійкість до сірої гнилі, бал                                   | 9,0      | 8,8     |   |
| Стійкість до вовчка, бал  | 7,4      | 8,8     |   |
| Лушпинність, %  | 26,2     | 27,1    |   |
| Вміст олії, %   | 50,4     | 50,8    |   |
| Вміст білка, %  | 18,3     | 18,6    |   |
| Збір олії, кг/га  | 1481     | 1379    |   |
| Напрямок використання   | Олійний  | Олійний |   |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп.