

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 1408013 Назва сорту: Взірець Заявник (код): 1710 Власник сорту (код): 1710

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170808

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: розмір	середній	5
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	слабка	3
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: форма верхівки	відкрита	5
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	листковий	3
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: за відкритістю	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	помірне	5
20	Друга пара бічних листочків: розмір	середній	5
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	середні	5
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення	відсутнє або дуже рідко	1
23	Листочек: хвильистість краю	слабка	3
24	Листочек: заглиблення жилок	середнє	5
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	помірно глянсуватий	5
26	Листочек: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: рясність цвітіння	рясне	7
30	Суцвіття: розмір	середній	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1
36	Рослина: час дотигання	ранній	3
37	Бульба: форма	овальна	3
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5
39	Бульба: забарвлення шкірки	світло-бежеве	1
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	слабке	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	127,4	189,8	151,3
+,- до усередненої урожайності, ц/га	-	-	-
+,- до усередненої урожайності, %	-	-	-
Вміст крохмалю, %	15,9	17,8	17,3
Збір крохмалю, ц/га	20,3	33,7	26,2
Вміст сухої речовини, %	23,2	26,5	25,7
Діб, від повних сходів до всихання бадилля	68	60	56
Маса бульб, г	74,9	76,6	71,1
Смакові якості, бал	7	6	7
Товарність бульб, %	81,8	77,1	87,7
Лежкість, бал	-	5	7
Стійкість до пошкодження нематодою, бал	9	9	9
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Ст.	Ст.	Ст.
Якість	ск	пк	пк
Напрям використання	Столовий	Столовий	Столовий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.