

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 13088012 Назва сорту: Констанс **Заявник (код):** 1652 **Власник сорту (код):** 1652

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.04.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170806

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| 1 | Світловий паросток: розмір | середній | 5 |
| 2 | Світловий паросток: форма | сферична | 1 |
| 3 | Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи | слабка | 3 |
| 4 | Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи | відсутнє або дуже мале | 1 |
| 5 | Світловий паросток: опушення основи | слабке | 3 |
| 6 | Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою | середня | 5 |
| 7 | Світловий паросток: форма верхівки | закрита | 1 |
| 8 | Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки | слабке | 3 |
| 9 | Світловий паросток: опушення верхівки | слабке | 3 |
| 10 | Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків | мало | 3 |
| 11 | Світловий паросток: бічні пагони за довжиною | короткі | 3 |
| 12 | Рослина: тип розвитку | листяковий | 3 |
| 13 | Рослина: габітус | напіврозлогий | 5 |
| 14 | Стебло: антоціанове забарвлення | помірне | 5 |
| 15 | Листок: загальний розмір | середній | 5 |
| 16 | Листок: за відкритістю | проміжний | 3 |
| 17 | Листок: виявлення вторинних листочків | помірне | 5 |
| 18 | Листок: зелене забарвлення | темне | 7 |
| 19 | Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці | слабке | 3 |
| 20 | Друга пара бічних листочків: розмір | середній | 5 |
| 21 | Друга пара бічних листочків: за шириною | вузькі | 3 |
| 22 | Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення | рідко | 3 |
| 23 | Листочок: хвилястість краю | помірна | 5 |
| 24 | Листочок: заглиблення жилок | середнє | 5 |
| 25 | Листочок: глянуватість верхнього боку | помірно глянуватий | 5 |
| 26 | Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки | наявне | 9 |
| 27 | Бутон: антоціанове забарвлення | слабке | 3 |
| 28 | Рослина: за висотою | середня | 5 |
| 29 | Рослина: яскравість цвітіння | помірне | 5 |
| 30 | Суцвіття: розмір | великий | 7 |
| 31 | Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки | помірне | 5 |
| 32 | Віночок квітки: розмір | великий | 7 |
| 33 | Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку | відсутнє або дуже слабка | 1 |
| 34 | Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку | відсутнє або мале | 1 |
| 35 | Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці | відсутнє або дуже мале | 1 |
| 36 | Рослина: час досягання | середній | 5 |
| 37 | Бульба: форма | куляста | 1 |
| 38 | Бульба: вічка за глибиною | середні | 5 |
| 39 | Бульба: забарвлення шкірки | світло-бежеве | 1 |
| 40 | Бульба: забарвлення основи вічка | жовте | 2 |
| 41 | Бульба: забарвлення м'якоті | світло-жовте | 3 |
| 42 | Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла | помірне | 5 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | - | 215,6 | 166 |
| +, - до усередненої урожайності, ц/га | - | -6,9 | -62,5 |
| +, - до усередненої урожайності, % | - | -3,1 | -27,3 |
| Вміст крохмалю, % | - | 15,1 | 15,2 |
| Збір крохмалю, ц/га | - | 32,6 | 25,2 |
| Вміст сухої речовини, % | - | 22,5 | 22,7 |
| Діб, від повних сходів до всихання бадилля | - | 89 | 60 |
| Маса бульб, г | - | 93,8 | 76,8 |
| Смакові якості, бал | - | 6 | 6 |
| Товарність бульб, % | - | 83,3 | 85,2 |
| Лежкість, бал | - | 7 | 7 |
| Стійкість до пошкодження нематодою, бал | - | 7 | 7 |
| Стійкість до звичайного патотипу збудника раку | - | Ст. | Ст. |
| Якість | - | ск | ск |
| Напрямок використання | - | Столовий | Столовий |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.