

Вид: Горошок посівний (ярий) *Vicia sativa* L.

Заявка № 14177006 **Назва сорту:** НАКР **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.03.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170314

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|------------------------|-----|
| 1 | Сіянець: співвідношення довжини / ширини листочків другого справжнього листка | мале | 3 |
| 2 | Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла | наявне | 9 |
| 3 | Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення основи стебла | слабка | 3 |
| 4 | Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків | слабка | 3 |
| 5 | Час початку цвітіння | ранній | 3 |
| 6 | Стебло: опушення верхнього міжвузля | наявне | 9 |
| 7 | Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків | помірне | 5 |
| 8 | Листок: форма верхівки листочків | увігнута | 7 |
| 9 | Листок: листочок за шириною | середній | 5 |
| 10 | Прилисток: антоціанове забарвлення залозок | помірне | 5 |
| 11 | Квітка: забарвлення паруса | світло-фіолетове | 3 |
| 12 | Біб: опушення | слабке | 3 |
| 13 | Біб: за довжиною (без дзьобика) | середній | 5 |
| 14 | Біб: за шириною | середній | 5 |
| 15 | Біб: дзьобик за довжиною | короткий | 3 |
| 16 | Біб: кількість насінневих зачатків | середня | 5 |
| 17 | Насіння: маса | велика | 7 |
| 18 | Насіння: за форма | куляста | 1 |
| 19 | Насіння: основне забарвлення насіннєвої оболонки | білувате | 1 |
| 20 | Насіння: коричнева орнаментация | цятками і плямами | 4 |
| 21 | Насіння: виявлення коричневої орнаментации | сильне | 7 |
| 22 | Насіння: блакитно-чорна орнаментация | відсутня | 1 |
| 23 | Насіння: виявлення блакитно-чорної орнаментации | ознака не визначається | 0 |
| 24 | Насіння: забарвлення сім'ядолей | сірувато-коричневе | 1 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|----------|----------|
| | С | Л | П |
| Урожайність сухої речовини, ц/га | 43,4 | 53,1 | 57,9 |
| +, - до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га | 0,5 | -2,8 | -7,2 |
| % | 1 | -5 | -11 |
| Урожайність насіння, ц/га | 15,8 | 20,7 | 20,7 |
| Вегетаційний період, днів | 45 | 64 | 56 |
| Стійкість до: бал | | | |
| Вилітання | 7,0 | 6,7 | 8,0 |
| Осіпання | 8,5 | 7,7 | 7,7 |
| Посухи | 8,5 | 7,9 | 8,2 |
| Аскохітозу | 8,5 | 8,4 | 8,6 |
| Іржі | 8,0 | 8,4 | 8,4 |
| Залистяність, % | 55,2 | 62,0 | 55,8 |
| Вміст сирого протеїну, % | 20,1 | 19,2 | 19,7 |
| Напрямок використання | кормовий | кормовий | кормовий |
| Усереднена врожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га | 42,8 | 55,9 | 65,1 |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.