

Вид: Горошок посівний (ярий) *Vicia sativa* L.

Заявка № 14177004 **Назва сорту:** Новий Белград **Заявник (код):** 1978 1210 **Власник сорту (код):** 1978 1210

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.03.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170312

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: співвідношення довжини /ширини листочків другого справжнього листка	мале	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення основи стебла	слабка	3
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	слабка	3
5	Час початку цвітіння	ранній	3
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	наявне	9
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	слабке	3
8	Листок: форма верхівки листочків	увігнута	7
9	Листок: листочок за шириною	середній	5
10	Прилисток: антоціанове забарвлення залозок	слабке	3
11	Квітка: забарвлення паруса	світло-фіолетове	3
12	Біб: опушення	помірне	5
13	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5
14	Біб: за шириною	середній	5
15	Біб: дзьобик за довжиною	короткий	3
16	Біб: кількість насінневих зачатків	середня	5
17	Насіння: маса	велика	7
18	Насіннина: за форма	куляста	1
19	Насіння: основне забарвлення насіннєвої оболонки	білувате	1
20	Насіння: коричнева орнаментация	цятками і плямами	4
21	Насіння: виявлення коричневої орнаментации	сильне	7
22	Насіннина: блакитно-чорна орнаментация	відсутня	1
23	Насіннина: виявлення блакитно-чорної орнаментации	ознака не визначається	0
24	Насіннина: забарвлення сім'ядолей	сірувато-коричневе	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	42,7	58,6	58,7
+, - до усереднені урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	-0,1	2,7	-6,4
%	0	5	-10
Урожайність насіння, ц/га	13,4	22,9	22,9
Вегетаційний період, діб	51	62	54
Стойкість до: бал			
Вилгання	6,2	6,8	7,7
Осіпання	7,8	8,0	8,0
Посухи	8,6	7,8	8,4
Аскохітозу	8,6	8,8	8,6
Іржі	8,2	8,5	8,4
Залистяність, %	52,2	61,5	55,3
Вміст сирого протеїну, %	20,8	20,0	19,6
Напрямок використання	кормовий	кормовий	кормовий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп.