

**Вид:** Горошок посівний (ярий) *Vicia sativa* L.

**Заявка № 14177005 Назва сорту:** СПІДО **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.03.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170313**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: співвідношення довжини /ширини листочків другого справжнього листка	мале	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення основи стебла	слабка	3
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	слабка	3
5	Час початку цвітіння	ранній	3
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	наявне	9
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	помірне	5
8	Листок: форма верхівки листочків	увігнута	7
9	Листок: листочок за шириною	середній	5
10	Прилисток: антоціанове забарвлення залозок	слабке	3
11	Квітка: забарвлення паруса	світло-фіолетове	3
12	Біб: опушення	слабке	3
13	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5
14	Біб: за шириною	середній	5
15	Біб: дзьобик за довжиною	короткий	3
16	Біб: кількість насінневих зачатків	середня	5
17	Насіння: маса	велика	7
18	Насіння: за форма	куляста	1
19	Насіння: основне забарвлення насіннєвої оболонки	білувате	1
20	Насіння: коричнева орнаментация	цятками і плямами	4
21	Насіння: виявлення коричневої орнаментации	сильне	7
22	Насіння: блакитно-чорна орнаментация	відсутня	1
23	Насіння: виявлення блакитно-чорної орнаментации	ознака не визначається	0
24	Насіння: забарвлення сім'ядолей	оранжеве	2

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	43,6	57	55,5
+, - до усереднені урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	0,8	1,1	-9,7
%	2	2	-15
Урожайність насіння, ц/га	17	20,8	20,8
Вегетаційний період, днів	45	64	55
Стійкість до: бал			
Вилягання	6,0	6,7	8,2
Осіпання	8,5	7,7	7,7
Посухи	8,0	7,6	7,8
Аскохітозу	8,5	8,4	8,6
Іржі	7,5	8,7	8,6
Залистяність, %	52,8	63,5	55,4
Вміст сирого протеїну, %	20,0	20,1	19,6
Напрямок використання	кормовий	кормовий	кормовий
Усереднена врожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	42,8	55,9	65,1

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп.