

Вид: Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata*

Заявка № 15421015 Назва сорту: Мерлінас **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.05.2018 **Патент № 180904**

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180714

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	ознака не визначалась	0
4	Сіянець: форма сім'ядолей	ознака не визначалась	0
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	дуже сильне	9
10	Головка: за щільністю	дуже щільна	9
11	Головка: розмір	середній	5
12	Лише для сортів маслянистогоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначалась	0
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3
14	Листок: за товщиною	товстий	7
15	Листок: положення за збиральної стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	ознака не визначалась	0
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	сіруватий	3
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	сильна	7
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянуватість верхнього боку	відсутня або дуже слабка	1
25	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявні	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірна	5
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	зубчаста	2
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне жилкування	помірне	5
34	Час збиральної стиглості	дуже пізній	9
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	ознака не визначалась	0
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стойкість проти борошнистої роси (<i>Bremia lactuca</i>) Isolate B1: 16	наявна	9
40	Стойкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1
41	Стойкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i>)	наявна	9
42	Стойкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	сприятливий (відсутня)	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 25. Середня маса головки, г – 560. Щільність головки, бал (1–9) – 5. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стиглості, діб – 69. Група стиглості (3 – рання; 5 – середня; 7 – пізня) – 5. Вміст у головках: сухої речовини, % – 4,8. Вміст у головках: цукрів, % – 1,9, вітаміну С, мг% – 2,8. Холодостійкість, бал (1–9) – 6. Посухостійкість, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.