

Вид: Люцерна мінлива *Medicago x varia* Martyn

Заявка № 13364001 Назва сорту: Елегія **Заявник (код):** 1698 **Власник сорту (код):** 1698

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.03.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170547

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	напівпрямий	3
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	коротка	3
5	Час початку цвітіння	середній	5
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	низька	3
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	відсутня або дуже низька	1
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	низька	3
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	низька	3
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	низька	3
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 5	5
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	ознака не визначалась	0
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	ознака не визначалась	0
19	Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i>	ознака не визначалась	0
20	Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i>	ознака не визначалась	0
21	Стійкість до <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	ознака не визначалась	0
22	Стійкість до <i>Therioaphis maculata</i>	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	47	101,6	90,3
+, - до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	-25,3	19	-9,2
%	-35	23	-9
Вегетаційний період, днів	54	75	71
Стійкість до: бал			
Вилягання	8,0	9,0	9,0
Посухи	7,0	8,0	8,0
Стеблової іржі	8,0	8,7	8,5
Борошнистої роси	8,5	9,0	9,0
Перезимувало рослин, бал	9,0	8,0	4,0
Залистяність, %	40,8	40,5	44,3
Вміст сирого протеїну, %	19,4	18,8	18,3
Напрямок використання	кормовий	кормовий	кормовий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.