

**Вид:** Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

**Заявка № 17120001 Назва сорту:** Авірам **Заявник (код):** 2070 **Власник сорту (код):** 2070

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.04.2018

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180720**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	часточкова	2
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	відкрита головка	2
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0
10	Головка: за щільністю	нещільна	3
11	Головка: розмір	малий	3
12	Лише для сортів маслянистогоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	середнє	5
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3
14	Листок: за товщиною	середній	5
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салату)	напівпряме	3
16	Листок: форма	широкоеліптична	3
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	слабка	3
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянуватість верхнього боку	помірна	5
25	Листок: пухирчастість	слабка	3
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	слабка	3
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабке	1
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	ранній	3
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	середня	5
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Izolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9
41	Стійкість проти попелици (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	ознака не визначалася	0
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	стійкий (наявна)	9

**За інформацією наданою заявником:**

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 18. Тривалість періоду до досягання, діб – 45.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.