

**Вид:** Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.**Заявка № 14122003 Назва сорту:** Бетті **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №**Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.05.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170765****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Супліддя	одноросткове	1
2	Паросток: червоне забарвлення гілокотиля	наявне	9
3	Листок: положення черешка	пряме	1
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	короткий	3
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
8	Листкова пластинка: форма	вузькоеліптична	3
9	Листкова пластинка: колір	зелений або червоний	2
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	дуже сильне	9
12	Листкова пластинка: хвильистість краю	слабка	3
13	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
14	Листковий черешок: за шириною основи	вузький	3
15	Листковий черешок: основний колір зворотнього боку	пурпуровий	4
16	Коренеплід: загиблість у ґрунті	глибока	7
17	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	яйцевидна	4
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3
20	Коренеплід: відношення довжина/ ширина	середнє	3
21	Коренеплід: форма основи	загострена	1
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	слабке	3
23	Коренеплід: колір шкірки	червонувато-пурпуровий	3
24	Коренеплід: основне забарвлення мякоті	пурпурове	4
25	Коренеплід: інтенсивність забарвлення мякоті	темна	7
26	Коренеплід: виявлення кілець	помірне	5
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Урожайність коренеплодів: загальна – 80 т/га; товарна – 65 т/га. Середня маса товарного коренеплоду – 350 г. Тривалість періоду: від повних сходів до пучкової стигlosti коренеплодів – 75 діб; від повних сходів до товарної (технічної) стигlosti коренеплодів – 100 діб. Вміст у коренеплодах: сухої речовини – 19%; вміст загального цукру – 5%; вміст вітаміну С – 5 мг/100 г.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Полісся, Лісостеп, Степ.