

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка № 14122006 Назва сорту: Рубі Бой **Заявник (код):** 1926 **Власник сорту (код):** 1926

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.05.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170766

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Супліддя	одноросткове	1
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотилля	наявне	9
3	Листок: положення черешка	напівпряме	3
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	середній	5
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	5
9	Листкова пластинка: колір	в основному зелений	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	помірне	5
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3
13	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
14	Листковий черешок: за шириною основи	вузький	3
15	Листковий черешок: основний колір зворотнього боку	пурпуровий	4
16	Коренеплід: заглибленість у ґрунті	середня	5
17	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	яйцевидна	4
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3
20	Коренеплід: відношення довжина/ ширина	середнє	3
21	Коренеплід: форма основи	загострена	1
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	помірне	5
23	Коренеплід: колір шкірки	червонувато-пурпуровий	3
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4
25	Коренеплід: інтенсивність забарвлення м'якоті	темна	7
26	Коренеплід: виявлення кілець	слабке	3
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Вміст сухої речовини в коренеплоді – 13,5 %. Середній урожай коренеплодів – 80 т/га. Вміст загального цукру – 8,7 %. Маса товарного коренеплоду – 300 г. Тривалість періоду від повних сходів до початку досягання – 50 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ.