

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

Заявка № 16120015 Назва сорту: Верала **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.04.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180717

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	біле	1
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	наявне	9
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	великі	7
4	Сіянець: форма сім'ядолей	широкоеліптична	7
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	пряме	1
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	часточкова	2
7	Рослина: діаметр	малий	3
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма позовжнього розрізу	ознака не визначається	0
14	Листок: за товщиною	середній	5
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	пряме	1
16	Листок: форма	поперечно-вужкоеліптична	6
17	Листок: форма верхівки	гостра	1
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	червонуватий	4
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	слабка	3
20	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	локальне	1
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	тільки дифузне	1
24	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3
25	Листок: пухирчастість	помірна	5
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	сильна	7
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	помірна	5
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірна	5
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	нев'ялоподібне	1
33	Пазушне гілкування	слабке	3
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	пізній	7
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	середня	5
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	слабка	3
39	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) Izolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9
41	Стійкість проти попелици (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i>)	наявна	9
42	Стійкість проти <i>fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	стійкий (наявна)	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 29. Тривалість періоду до досягання, діб – 50.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.