

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 13020011 Назва сорту: Корінна Заявник (код): 926 Власник сорту (код): 926

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.10.2016 Патент № 160895

Дата пріоритету: 19.11.2013

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160501

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака   | Проявлення               | Код |
|----|--|--------------------------|-----|
| 1  | Рослина: габітус   | напівпрямий              | 3   |
| 2  | Нижні листки: опушення піхви   | відсутнє                 | 1   |
| 3  | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок                                  | наявне                   | 9   |
| 4  | Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок                  | слабке                   | 3   |
| 5  | Рослина: частота рослин з викривленим прапорцевим листком                          | мало                     | 3   |
| 6  | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві  | помірний                 | 5   |
| 7  | Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)                            | середнє                  | 5   |
| 8  | Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків                               | наявне                   | 9   |
| 9  | Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків                           | помірне                  | 5   |
| 10 | Колос: восковий наліт  | слабкий                  | 3   |
| 11 | Колос: положення у просторі  | напівпряме               | 3   |
| 12 | Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками)                                     | дуже низька              | 1   |
| 13 | Колос: кількість рядів   | два                      | 1   |
| 14 | Колос: форма   | циліндрична              | 5   |
| 15 | Колос: за щільністю  | нешільний                | 3   |
| 16 | Колос: за довжиною (без остюків)   | середній                 | 2   |
| 17 | Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)  | довші                    | 3   |
| 18 | Стрижень колосу: довжина першого сегменту  | середній                 | 5   |
| 19 | Стрижень колоса: вигин першого сегмента  | великий                  | 7   |
| 20 | Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)                          | паралельне               | 1   |
| 21 | Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки              | довша                    | 3   |
| 22 | Зернівка: довжина волосків основної щетинки  | довгі                    | 2   |
| 23 | Зернівка: наявність півки  | наявна                   | 9   |
| 24 | Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски | відсутнє або дуже слабке | 1   |
| 25 | Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски               | відсутнє або дуже слабке | 1   |
| 26 | Зернівка: опушення вентральної борідки   | відсутнє                 | 1   |
| 27 | Зернівка: розташування лодикул   | охоплююче                | 2   |
| 28 | Зернівка: забарвлення алейронового шару  | слабко забарвлена        | 2   |
| 29 | Тип розвитку   | ярий                     | 3   |
| 30 | Колос: остюки  | наявні                   | 9   |
| 31 | Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення                              | остюки                   | 5   |
| 32 | Зернівка: форма  | видовжено-еліптична      | 5   |
| 33 | Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски                                      | тонкозморшківата         | 1   |
| 34 | Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски        | відсутнє                 | 9   |
| 35 | Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка                         | поступовий               | 2   |
| 36 | Вушка: форма верхівки  | шилоподібна              | 3   |
| 37 | Вушка: охоплення соломини  | перекриваюче             | 3   |
| 38 | Язичок: ступінь виявлення  | середній                 | 5   |
| 39 | Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)                 | слабко виповнена         | 3   |
| 40 | Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)                                   | наявна                   | 9   |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник                              | Значення |      |      |
|---------------------------------------|----------|------|------|
|                                       | С        | Л    | П    |
| Урожайність, ц/га                     | 28,7     | 44,7 | 43,7 |
| Гарантована прибавка до усеред. урож. |          |      |      |
| ц/га                                  | 0,4      | 2,7  | 7,6  |
| %                                     | 1        | 6    | 21   |
| Вегетаційний період, днів             | 86       | 86   | 92   |
| Висота рослин, см                     | 51,1     | 59,5 | 62,7 |
| Маса 1000 зерен, г                    | 44,7     | 47,9 | 49,9 |
| Стійкість до: бал                     |          |      |      |
| Полягання                             | 9,0      | 8,6  | 8,6  |
| Осіпання                              | 9,0      | 8,7  | 8,8  |
| Посухи                                | 7,9      | 8,5  | 8,5  |
| Гельмінтоспориозу                     | 8,3      | 8,5  | 8,3  |
| Сажки                                 | 9,0      | 8,9  | 8,7  |
| Борошнистої роси                      | 8,2      | 8,7  | 8,1  |
| Вміст білка, %                        | 13,0     | 12,4 | 12,4 |
| Вирівняність зерна                    | 93,3     | 96,9 | 98,4 |
| Напрямок використання                 | зерновий |      |      |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп, Полісся.