

Вид: Горох посівний *Pisum sativum* L.

Заявка № 12001004 Назва сорту: Гамбіт Заявник (код): 880 Власник сорту (код): 880

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.12.2016 Патент № 160785

Дата пріоритету: 23.01.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150339

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1
3	Стебло: фасціація	відсутня	1
4	Стебло: за довжиною	коротке	3
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	мала	3
6	Листя: забарвлення	жовто-зелене	1
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків. (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0
8	Листок: листочки	відсутні	1
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0
10	Листочек: розмір	ознака не визначається	0
11	Листочек: за довжиною	ознака не визначається	0
12	Листочек: за шириною	ознака не визначається	0
13	Листочек: положення найширшої частини	ознака не визначається	0
14	Листочек: зубчастість	ознака не визначається	0
15	Прилисток: за довжиною	короткий	3
16	Прилисток: за шириною	вузький	3
17	Прилисток: розмір	малий	3
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	коротка	3
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	коротка	3
20	Прилисток: плямистість	наявна	9
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	середній	5
24	Рослина: час цвітіння	пізній	7
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	три	5
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1
28	Квітка: парус за шириною	середній	5
29	Квітка: форма основи паруса	піднесена	3
30	Квітка: хвилястість паруса	помірна	5
31	Квітка: чашолисток за шириною	вузький	3
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	округла	3
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3
34	Квітконос: відстань від стебла до первого бобу	коротка	3
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3
36	Квітконос: кількість приквітків	середня	2
37	Біб: за довжиною	короткий	3
38	Біб: за шириною	вузький	3
39	Біб: пергаментний шар	відсутній або частковий	1
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	відсутнє	1
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	загострена	1
42	Біб: вигин	слабкий	3
43	Біб: забарвлення	зелене	2
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (озн. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	відсутні	1
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	мала	3
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
48	Насіння: форма	еліптична	1
49	Насіння: тип крохмальних зерен	простий	1
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насіння: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насіння: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0
52	Насіння: забарвлення сім'ядолей	жовте	2
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіння: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіння: фіолетові чи рожеві плями на насінній шкірці	ознака не визначається	0
55	Насіння: забарвлення рубчика	темніше за насіннєву шкірку	2
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіння: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0
57	Насіння: маса	середня	5
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	наявна	9
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	наявна	9
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	наявна	9
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	наявна	9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	19,0	29,5	32,1
Гарантована прибавка до національного стандарту, ц/га	1,4	0,9	4,8
Гарантована прибавка до національного стандарту, %	8,0	3,1	17,6
Вегетаційний період, діб	77	76	84
Висота рослин, см.	59,9	68,0	93,5
Маса 1000 насінин, г	217,6	218,5	219,5
Стійкість до полягання, б	8,6	8,5	7,9
Стійкість до осипання, б	8,6	8,3	8,0
Стійкість до посухи, б	6,8	8,2	8,5
Стійкість до переноспорозу, б	8,6	8,2	7,7
Стійкість до кореневих гнилей, б	8,8	7,9	8,7
Стійкість до аскохітозу, б	8,4	8,3	8,8
Стійкість до антракнозу, б	8,5	8,3	9,0
Вміст білка, %	24,4	22,6	24,0
Напрям використання:	зерновий		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.