

Вид: Горох посівний *Pisum sativum* L.

Заявка № 10001001 Назва сорту: Слован Заявник (код): 880 Власник сорту (код): 880

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.12.2016 Патент № 160784

Дата пріоритету: 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140321

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1
3	Стебло: фасціація	відсутня	1
4	Стебло: за довжиною	коротке	3
5	Стебло: кількість вузлів (перший fertильний вузол включно)	мала	3
6	Листя: забарвлення	жовто-зелене	1
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків. (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0
8	Листок: листочки	відсутні	1
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0
10	Листочек: розмір	ознака не визначається	0
11	Листочек: за довжиною	ознака не визначається	0
12	Листочек: за шириною	ознака не визначається	0
13	Листочек: положення найширшої частини	ознака не визначається	0
14	Листочек: зубчастість	ознака не визначається	0
15	Прилисток: за довжиною	короткий	3
16	Прилисток: за ширину	вузький	3
17	Прилисток: розмір	малий	3
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	середня	5
20	Прилисток: плямистість	наявна	9
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	середній	5
24	Рослина: час цвітіння	середній	5
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	три	5
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1
28	Квітка: парус за ширину	вузький	3
29	Квітка: форма основи паруса	піднесена	3
30	Квітка: хвилястість паруса	слабка	3
31	Квітка: чахолисток за ширину	середній	5
32	Квітка: форма верхівки верхнього чахолистка	округла	3
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	середня	5
34	Квітконос: відстань від стебла до первого бобу	середня	5
35	Квітконос: відстань між первістком і другим бобом	середня	5
36	Квітконос: кількість прів'ятків	середня	2
37	Біб: за довжиною	короткий	3
38	Біб: за ширину	середній	5
39	Біб: пергаментний шар	відсутній або частковий	1
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	відсутнє	1
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	загострена	1
42	Біб: вигин	відсутній або дуже слабкий	1
43	Біб: забарвлення	зелене	2
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (озн. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	відсутні	1
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	мала	3
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
48	Насіння: форма	еліптична	1
49	Насіння: тип крохмальних зерен	простий	1
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насіння: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насіння: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0
52	Насіння: забарвлення сім'ядолей	жовте	2
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіння: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіння: фіолетові чи рожеві плями на насінній шкірці	ознака не визначається	0
55	Насіння: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіння: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0
57	Насіння: маса	середня	5
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	наявна	9
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	наявна	9
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	наявна	9
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	наявна	9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	18,4	27,2	23,9
Гарантована прибавка, ц/га	0,7	-0,5	-1,6
%	4,0	-1,8	6,3
Вегетаційний період, днів	74	76	80
Стійкість до: бал			
-виллягання	8,4	8,4	8,3
-осипання	8,4	8,3	7,8
-посухи	6,6	7,8	8,0
-аскохітозу	8,9	8,5	8,5
-антракнозу	9,0	8,5	8,4
-кореневих гнилей	8,9	8,1	8,5
Якісні характеристики:			
-вміст білка, %	22,0	21,3	20,8
Напрям використання	зерно	зерно	зерно
Висота рослини, см	47,5	61,3	74,0
Маса 1000 насінин, см	231,5	222,5	228,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.