

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 12016035 Назва сорту: Панчер Заявник (код): 1991 Власник сорту (код): 1991

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.10.2016 Патент № 160880

Дата пріоритету: 08.05.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151153

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	20	35,2	20,8
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	1,5	6,3	-5,5
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	8	22	-21
Маса 1000 насінин, г	4,3	5	4,7
Висота рослин, см	115,7	133,6	113,5
Стійкість до вилягання, бал	8,5	8,8	9
Стійкість до посухи, бал	7	7,7	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,3	7	7,2
Перезимувало рослин, бал	7,5	8,2	8,1
Днів до досягання	290	293	309
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,8	9	9
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,8	9	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,8	9	9
Вміст білка, %	22,5	21,1	19
Вміст олії, %	47,4	48,8	50,9
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,6	0,6
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,1

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп.