

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*
Заявка № 12016036 Назва сорту: Раствлер **Заявник (код):** 1991 **Власник сорту (код):** 1991
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.10.2016 **Патент № 160881**
Дата пріоритету: 08.05.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 151154
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	18,1	34,1	21,7
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	-0,3	5,2	-4,6
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	-2	18	-17
Маса 1000 насінин, г	4,1	5,2	4,7
Висота рослин, см	122,1	133	122
Стійкість до вилягання, бал	8,3	8,6	9
Стійкість до посухи, бал	7	7,7	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,1	7,2	7,4
Перезимувало рослин, бал	7,8	8,2	8,1
Днів до досягання	289	292	309
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,8	9	9
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8	9	7,4
Стійкість до бактеріозу, бал	9	9	8,1
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,8	9	9
Вміст білка, %	23	21,7	20
Вміст олії, %	46,8	48,1	49,8
Вміст глюканолатів, %	0,8	0,7	0,8
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.