

**Вид:** Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

**Заявка № 16120017 Назва сорту:** Редін **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 18.04.2018

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180719**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака   | Проявлення             | Код |
|----|--|------------------------|-----|
| 1  | Насінина: забарвлення  | біле                   | 1   |
| 2  | Сіянець: антоціанове забарвлення   | відсутнє               | 1   |
| 3  | Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)   | малі                   | 3   |
| 4  | Сіянець: форма сім'ядолей  | еліптична              | 5   |
| 5  | Листок: положення у стадії 10-12 листків   | пряме                  | 1   |
| 6  | Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)  | часточкова             | 2   |
| 7  | Рослина: діаметр   | малий                  | 3   |
| 8  | Рослина: утворення головки   | не утворює             | 1   |
| 9  | Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків  | ознака не визначається | 0   |
| 10 | Головка: за щільністю  | ознака не визначається | 0   |
| 11 | Головка: розмір  | ознака не визначається | 0   |
| 12 | Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи   | ознака не визначається | 0   |
| 13 | Головка: форма позовжнього розрізу   | ознака не визначається | 0   |
| 14 | Листок: за товщиною  | середній               | 5   |
| 15 | Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів) | пряме                  | 1   |
| 16 | Листок: форма  | вузькоеліптична        | 1   |
| 17 | Листок: форма верхівки   | гостра                 | 1   |
| 18 | Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків  | червонуватий           | 4   |
| 19 | Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків  | слабка                 | 3   |
| 20 | Листок: антоціанове забарвлення  | наявне                 | 9   |
| 21 | Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення  | сильна                 | 7   |
| 22 | Листок: поширення антоціанового забарвлення  | локальне               | 1   |
| 23 | Листок: тип поширення антоціанового забарвлення  | тільки дифузне         | 1   |
| 24 | Листок: глянуватість верхнього боку  | слабка                 | 3   |
| 25 | Листок: пухирчастість  | слабка                 | 3   |
| 26 | Листок: розмір пухирів   | малий                  | 3   |
| 27 | Листкова пластинка: хвилястість краю   | сильна                 | 7   |
| 28 | Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки   | наявна                 | 9   |
| 29 | Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною   | помірна                | 5   |
| 30 | Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки   | помірна                | 5   |
| 31 | Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості   | ознака не визначається | 0   |
| 32 | Листкова пластинка: жилкування   | невіялоподібне         | 1   |
| 33 | Пазушне жилкування   | слабке                 | 3   |
| 34 | Час збиральної стиглості   | середній               | 5   |
| 35 | Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня  | середній               | 5   |
| 36 | Рослина: за висотою (квітуча рослина)  | середня                | 5   |
| 37 | Рослина: фасціація (під час цвітіння)  | наявна                 | 9   |
| 38 | Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)   | слабка                 | 3   |
| 39 | Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Izolate B1:16  | наявна                 | 9   |
| 40 | Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1   | наявна                 | 9   |
| 41 | Стійкість проти попелици (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )   | наявна                 | 9   |
| 42 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>   | стійкий (наявна)       | 9   |

**За інформацією наданою заявником:**

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 28. Тривалість періоду до досягання, діб – 48.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, ЗГр.