

**Вид:** Диня звичайна *Cucumis melo* L.

**Заявка № 15147002 Назва сорту:** Егназіо **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.03.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170316**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	середній	5
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	середній	5
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	слабка	3
4	Листкова пластинка: розмір	малий	3
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	середня	5
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3
9	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	пряме	3
11	Черешок: за довжиною	середній	5
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	андромонеоеційні	2
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	жовтувато-зелений	2
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	слабка	3
15	Молодий плід: щільність крапок	дуже щільна	9
16	Молодий плід: розмір крапок	малий	3
17	Молодий плід: контрастність крапок і основного забарвлення	слабка	3
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздок	відсутня або дуже слабка	1
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздок	ознака не визначається	0
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	тонка	3
22	Молодий плід: поширення темної площі навколо плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на ранніх стадіях розвитку	1
24	Плід: за довжиною	довгий	7
25	Плід: діаметр	великий	7
26	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	помірноеліптична	2
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за досягання)	жовте	2
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за досягання)	помірна	5
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за досягання)	відсутній або дуже слабкий	1
32	Плід: щільність крапок	дуже щільна	9
33	Плід: розмір крапок	малий	3
34	Плід: забарвлення крапок	жовте	2
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	помірна	5
36	Плід: щільність плям	відсутня або дуже нещільна	1
37	Плід: розмір плям	ознака не визначається	0
38	Плід: бородавки	відсутні	1
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	помірна	5
40	Плід: форма основи	загострена	1
41	Плід: форма верхівки	заокруглена	2
42	Плід: розмір маточкового рубця	середній	5
43	Плід: боріздки	відсутні або дуже слабко	1
44	Плід: боріздки за шириною	ознака не визначається	0
45	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0
46	Плід: забарвлення боріздок	ознака не визначається	0
47	Плід: зморшкватість поверхні	сильна	7
48	Плід: коркове утворення	відсутнє	1
49	Плід: корковий шар за товщиною	ознака не визначається	0
50	Плід: візерунок коркового утворення	ознака не визначається	0
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	ознака не визначається	0
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	відсутня або дуже низька	1
53	Плід: м'якоть в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	середня	5
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	біле	1
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	помірне	5
57	Плід: консистенція м'якоті	тверда	7
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	ознака не визначається	0
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	ознака не визначається	0
60	Насінина: за довжиною	довга	7
61	Насінина: за шириною	середня	5

№	Ознака	Проявлення	Код
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	помірна	5
65	Час цвітіння чоловічих квіток	середній	5
66	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5
67	Час досягання	середній	5
68	Термін зберігання плоду	тривалий	7
69,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. melonis	ознака не визначалась	0
69,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. melonis: Паса 1	ознака не визначалась	0
69,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. melonis: Паса 2	ознака не визначалась	0
69,4	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. melonis: Паса 1-2	ознака не визначалась	0
70,1	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ( <i>Podosphaera xanthii</i> ) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0
70,2	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ( <i>Podosphaera xanthii</i> ) (борошнистої роси): Паса 2	ознака не визначалась	0
70,3	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ( <i>Podosphaera xanthii</i> ) (борошнистої роси): Паса 5	ознака не визначалась	0
71	Стійкість до <i>Erysiphe cichoracearum</i> ( <i>Golovinomyces cichoracearum</i> ) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0
72	Стійкість до колоній ( <i>Aphis gossypii</i> )	ознака не визначалась	0
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні ( <i>ZYMV</i> )	ознака не визначалась	0
74,1	Стійкість до кільчастого вірусу папайї ( <i>PRSV</i> )	ознака не визначалась	0
74,2	Стійкість до кільчастого вірусу папайї ( <i>PRSV</i> ): Паса E2	ознака не визначалась	0
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині ( <i>MNSV</i> )	ознака не визначалась	0
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка ( <i>CMV</i> )	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна урожайність – 70 т/га, період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання плодів – 80 дів, вміст загального цукру – 17%, вміст сухої речовини в плодах – 9,5%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп, Полісся.