

Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* L. var. *gironmontia* Duch.

Заявка № 15148007 Назва сорту: Ісмалія **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.05.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170789

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: форма сім'ядолей	оберненойцеподібна	5
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірна	5
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	увігнута	1
4	Рослина: габітус	кущовий	1
5	Рослина: галуження	відсутнє	1
6	Рослина: ступінь галуження	ознака не визначається	0
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	напівпряме	3
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
10	Стебло: крапчастість	наявна	9
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1
12	Листкова пластинка: розмір	великий	7
13	Листкова пластинка: розсіченість	глибока	7
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	наявна	9
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	середня	5
17	Черешок: за довжиною	середній	5
18	Черешок: кількість шипів	середня	5
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	зелене	2
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	помірна	5
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте і зелене	3
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	помірна	5
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	середнє	5
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	конічно-циліндрична	6
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	зелене	4
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	слабка	3
30	Плід: переважаюча форма	циліндрична	9
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	середній	5
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	середній	5
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	середнє	5
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	округлий	1
46	Плід: боріздки	відсутні	1
47	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0
48	Плід: ребра	наявні	9
49	Плід: ступінь виявлення ребер	дуже слабкий	1
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	зелене	4
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	дуже слабка	1
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0

№	Ознака	Проявлення	Код
54	Плід: смужки на борізках	відсутні	1
55	Плід: забарвлення смужок на борізках	ознака не визначається	0
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	ознака не визначалась	0
57	Плід: плямистість	наявна	9
58	Плід: розмір основних плям	малий	3
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	відсутнє	1
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0
64	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3
65	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	сильна	7
68	Плід: крапчастість плодоніжки	наявна	9
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	жовте	4
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	слабка	3
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	ознака не визначається	0
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремowego)	наявний	9
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	слабкий	3
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	жовте	2
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1
77	Насінина: розмір	малий	3
78	Насінина: форма	вузькоеліптична	3
79	Насінина: лушпиння	наявне	9
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2
81	Насінина: забарвлення	білувате	1

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 140 т/га, період від масових сходів до настання технічної стиглості – 30 діб, вміст сухої речовини – 7,1%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.