

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.**Заявка № 13096016 Назва сорту:** Грін Стар **Заявник (код):** 1926 **Власник сорту (код):** 1926**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** **Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 25.11.2016**Свідоцтво про державну реєстрацію № 161043****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|------|---|----------------------------|-----|
| 1,1 | Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою | середня | 5 |
| 1,2 | Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою | ознака не визначається | 0 |
| 1,3 | Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою | ознака не визначається | 0 |
| 2,1 | Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками) | середній | 5 |
| 2,2 | Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) | ознака не визначається | 0 |
| 2,3 | Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) | ознака не визначається | 0 |
| 3 | Рослина: зовнішнє стебло за довжиною | середнє | 5 |
| 4 | Рослина: положення зовнішніх листків | напівпрямe | 3 |
| 5,1 | Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір | середній | 5 |
| 5,2 | Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір | ознака не визначається | 0 |
| 5,3 | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір | ознака не визначається | 0 |
| 6 | Зовнішній листок: форма пластинки | оберненояйцеподібна | 5 |
| 7 | Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки | увгнутий | 1 |
| 8,1 | Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості | помірний | 2 |
| 8,2 | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості | ознака не визначається | 0 |
| 9,1 | Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців | великий | 7 |
| 9,2 | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців | ознака не визначається | 0 |
| 10 | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість | ознака не визначається | 0 |
| 11 | Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом) | блакитно-зелене | 4 |
| 12 | Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення | помірна | 5 |
| 13 | Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість | ознака не визначається | 0 |
| 14 | Зовнішній листок: восковий наліт | помірний | 5 |
| 15 | Зовнішній листок: ступінь хвильості краю | помірний | 5 |
| 16 | Зовнішній листок: вигин краю | наявний | 9 |
| 17 | Головка: форма поздовжнього розрізу | широкообернено-яйцеподібна | 5 |
| 18 | Головка: форма основи у поздовжньому розрізі | ознака не визначалась | 0 |
| 19 | Головка: за довжиною | середня | 5 |
| 20 | Головка: діаметр | середній | 5 |
| 21 | Головка: розміщення найбільшого діаметра | посередині | 2 |
| 22 | Головка: ступінь покриття | частково покритий | 2 |
| 23 | Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка | ознака не визначається | 0 |
| 24 | Головка: вигин краю покривного листка | наявний | 9 |
| 25 | Головка: забарвлення покривного листка | зелене | 2 |
| 26 | Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка | ознака не визначалась | 0 |
| 27 | Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 28 | Головка: внутрішнє забарвлення | жовтувате | 2 |
| 29 | Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення | ознака не визначається | 0 |
| 30 | Головка: за щільністю | середня | 5 |
| 31 | Головка: внутрішня структура | середня | 5 |
| 32 | Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки | середня | 5 |
| 33,1 | Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стигlosti | середній | 5 |
| 33,2 | Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стигlosti | ознака не визначається | 0 |
| 33,3 | Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стигlosti | ознака не визначається | 0 |
| 34 | Час розтріскування головки після досягнання | середній | 5 |
| 35 | Чоловіча стерильність | ознака не визначалась | 0 |
| 36 | Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i> | ознака не визначалась | 0 |

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна урожайність – 57 т/га.Період від сівби до початку досягнання – 93 доби.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся, закритий ґрунт.