

**Вид:** Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.**Заявка № 15096006 Назва сорту:** Лібрето **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.03.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170331****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1.1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5
1.2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1.3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2.1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5
2.2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2.3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	середнє	5
4	Рослина: положення зовнішніх листків	розлого	5
5.1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5
5.2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
5.3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8.1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2
8.2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9.1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	малий	3
9.2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	зелене	2
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7
15	Зовнішній листок: ступінь хвильастості краю	слабкий	3
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1
19	Головка: за довжиною	середня	5
20	Головка: діаметр	середній	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	відсутній	1
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	бліувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5
33.1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стигlosti	пізній	7
33.2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стигlosti	ознака не визначається	0
33.3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стигlosti	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягнання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	відсутня	1
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	відсутня	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна урожайність – 75 т/га. Період від сівби до початку досягнання – 120 діб. Лежкість – 9 балів. Вміст вітаміну С – 46 мг%. Вміст загального цукру – 4,2%. Вміст сухої речовини – 7,5%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп, Полісся, закритий ґрунт.